

УДК 595. 423 (23470.67.0:212.7)

UDC595. 423 (23470.67.0:212.7)

**ОБЗОР ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ  
ACARIFORMES, ORIBATIDA  
ВНУТРЕННЕГО ГОРНОГО ДАГЕСТАНА****REVIEW OF TESTACEOUS MITES SPECIES OF  
ACARIFORMES, ORIBATIDA OF THE  
INTERNAL MOUNTAIN DAGESTAN**Абдурахманов Гайирбег Магомедович  
д.б.н., профессорAbdurakhmanov Gairbeg Magomedovich  
Dr.Sci.Biol., professorДавудова Элла Заметдиновна  
соискатель кафедры биологии и биоразнообразияDavudova Ella Zametdinovna  
applicant for degree of the Department of Biology and  
biodiversity«Дагестанский государственный университет»,  
Махачкала, Россия

«Dagestan State University», Makhachkala, Russia

В результате проведенных исследований на территории Внутреннего горного Дагестана выявлено 190 видов орибатид, относящиеся к 83 родам, из которых: один вид указан и описан как новый для науки [3]; 2 вида новых для Кавказа [2, 4]; 10 видов впервые отмечены для Дагестана [1, 2, 4]; 15 видов являются эндемичными кавказскими видами [4]

The research was made on the territory of the Internal mountain Dagestan. There were found 190 species of Oribatida belonging to 83 genera; 1 species is determined and scientifically described for the first time [3], 2 species are registered in the Caucasus for the first time [1, 2, 4], and 10 species are first found in Dagestan [2, 4], 15 species are endemic Caucasus species [4]

Ключевые слова: ВНУТРЕННЕГОРНЫЙ  
ДАГЕСТАН, ФАУНА, ОРИБАТИДЫ, РОДЫ,  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДОВ

Keywords: INTERNAL MOUNTAIN DAGESTAN,  
FAUNA, ORIBATIDA, GENUS, SPECIES  
DISTRIBUTION

В результате наших исследований обнаружено 190 видов (табл.1), относящихся к 83 родам, из которых: один вид указан и описан как новый для науки (*Oribatella (O.) abdurachmanovi* Shtanchaeva et Subías, 2009 [3]; 2 вида новых для Кавказа (*Suctobelbila dentata europaea* Moritz, 1974; *Hemileius (Simkinia) tianschanicus* Krivolutsky, 1971) [2, 4]; 10 видов впервые отмечены для Дагестана (*Galumna dimorpha* Krivolutskaja, 1952; *Liebstadia L. longior* Berlese, 1908; *Cosmochthonius reticulatus* Grandjean, 1947; *Acrotritia duplicata* Grandjean, 1953; *Acrogalumna longipluma longipluma* Berlese, 1904; *Brachychthonius berlesei* Willmann, 1928; *Cultroribula confinis* Berlese, 1908; *Phthiracarus P. laevigatus* Koch, 1841; *Acrotritia duplicata* Grandjean, 1953; *Steganacarus S. spinosus spinosus* Sellnick, 1920); 15 видов являются эндемичными кавказскими видами (*Epilohmannia daghestanica* Karppinen et Shtanchaeva, 1987; *Epilohmannia kulaginae* Shtanchaeva, 1993; *Liacarus Dorycranosus splendens ssp.*; *Xenillus sculptrus* Kulijev, 1963; *Suctobelba flagelliseta flagelliseta* Shtanchaeva et <http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/94.pdf>

Subías, 2009; *Suctobelbella S. liacariformis* Shtanchaeva et Subías, 2009; *Suctobelbella Flagrosuctobelba nana* Shtanchaeva et Subías, 2009; *Carabodes Klapperiches* sp. 1; *Lauropia* sp. 2; *Perscheloribates* sp.3; *Protoribates Triaungius* sp.4; *Achipteria longisetosa* Weigmann et Murvanidze, 2003; *Ferolocella cribraria* Kulijev, 1977; *Oribatula Zygoribatula spherisensilla* Djaparidze, 1985; *Oribatula Zygoribatula exilis clavatotrichobothria* Kulijev, 1962).

**Таблица - 1 Видовой состав и распространение панцирных клещей Внутреннегорного Дагестана**

№	Наименование вида	Распространение	Места находок на Кавказе
1.	<i>Hypochthonius luteus</i> Oudemans, 1917	Голарктика часто, северо-восток Восточной области и новая Зеландия.	Унцукульский р-н, окрестность с. Майданское РД Абрау, Ахты, Гуниб, Дылым, Куруш, Терско-Кумская низменность, Закаталы, Исмаиллы, Сальяны, Талыш, Ауадхара, Мюсера, Рица, Сакен, Матальква, Восточная Грузия, Тбилиси, Триалетский хребет, Батуми, Хино.
2.	<i>Hypochthonius rufulus</i> Koch, 1835	Семикосмополит Голарктика: часто, юго-восточный Китай, Сейшельские о-ва и Мексика	Унцукульский р-н, окрестности селений. Моксох, Балахани и Аракани РД, Северная Осетия, Махачкала, Самур, Закаталы, Исмаиллы, Куба, Хачмас, Апшерон, Ленкорань, Мюсера, Новый Афон, Испани, Тбилиси, Верхняя Картли, Колхида, Поты, Батуми, Манглиси, Дманиси, Марткоби, Годержи, Сера, Босели.
3.	<i>Hypochthoniella minutissima</i> Berlese, 1904	Космополит исключая Антарктику.	Новороссийск, Ростов, Сочи, Теберда, Чегет, Северная Осетия, Ахты, Гуниб, Куруш, <b>Махачкала</b> , Межгюль, Унцукуль район РД, Цумада, <b>Чираг</b> , Гирканский заповедник, Закаталы, Талыш, Батуми, Дилижан, Ауадхара, Бзыбь, Рица, Сухум, Восточная Грузия, Гомборский хребет, Лагодехи, Сагурамо, Манглиси, Хино, Королистави, Лагодехи, Хашури
4.	<i>Brachychthonius berleseii</i> Willmann, 1928	Голарктика часто	Окресность с. Моксох РД, Ростов, Сочи, Теберда, Северная Осетия, Дылым, Цумилух, Шеки, Рица, Мюсера, Новый Афон, Ходжала, Тбилиси, Мтацминда, Триалетский хребет
5.	<i>Brachychthonius hirtus</i> Moritz, 1976	центральная и южная Европа.	Сочи, Микрах, окрестность с. Майданское РД, Гирканский заповедник, Талыш
6.	<i>Brachychthonius</i>	Средиземноморье	Гоквари, Махачкала, Нюгди, окрестности с. Майданское РД, Цумада, Цумилух, Гирканский

	<i>pseudoimmaculatus</i> Subías et Gil-Martín, 1991		заповедник, Закаталы, Талыш, Карашамб, Севан, Бзыбь, <b>Рица</b> , Сатапли, Хашури
7.	<i>Liochthonius lapponicus</i> Trägårdh, 1910	Голарктика часто	Буршак, Гуниб, Куруш, Межгюль, Самур, Тлярата, Цумилух, окрестности с. Майданское РД, Закаталы, Дилижан, Севан, Бзыбь, <b>Рица</b> , Батуми
8.	<i>Liochthonius leptaleus</i> Moritz, 1976	центральная и южная Европа.	Ахты, Межгюль, Самур, г.Зуберха, окрестности с. Майданское РД, Цумада, Цумилух, Закаталы, Талыш, Дилижан, Салах, Севан, Бзыбь, Батуми
9.	<i>Liochthonius propinquus</i> Niedbała, 1972	западная Палеарктика исключая север.	Куруш, Крайновка, Микрах, Терско-Кумская низменность, окрестности с. Майданское РД, Цумилух, Гирканский заповедник, Талыш
10.	<i>Cosmochthonius reticulatus</i> Grandjean, 1947	Средиземноморье.	Новороссийск, Абрау, окрестность с. Балахани (почва соснового леса)РД
11.	<i>Sphaerochthonius splendidus</i> Berlese, 1904	Тропическая зона Восточная область: юго-восточный Китай, Австралийская область: Австралия и Полинезия, и Неотропическая область: Чили и Галапагосские о-ва субтропическая зона южная Голарктика: часто.	Ростов, Сочи, Абрау, Пятигорск, Буйнакск, Дербент, Новый Чиркей, Куруш, Самур, Крайновка, Терско-Кумская низменность, окрестности с. Майданское РД, Закавказье, Исмаиллы, Талыш, Карабах, Ленкорань, Гирканский заповедник, Мюсера, Рица, Сухум, Батуми, Мтацминда, Сагурамо, Тбилиси
12.	<i>Eulohmannia ribagai</i> Berlese, 1910	Голарктика часто и Юго-восточный Китай.	Моздок, Чегет, Гуниб, Куруш, окрестности с. Майданское РД, Цумада, Сакен, Сухум
13.	<i>Epilohmannia cylindrica cylindrica</i> Berlese, 1904	Космополит Палеарктика: менее часто на севере, Неарктическая и Эфиопская области: Чад, Восточная и Австралийская области: Гавайские о-ва, Неотропическая область: Куба и Галапагосские о-ва.	окрестности селений. Майданское, Аракани, Балахани и Моксох РД, Ростов, Новороссийск, Абрау, Домбай, Моздок, Гуниб, Кизилюрт, Избербаш, Левашы, Сарыкум, Тарумовка, Нюгди, Самур,, Гирканский заповедник, Талыш, Апшерон, Агдам, Гаджикенд, Гянджа Карабах, Кяляба, Ленкорань, Мингечаур, Сальяны, Шеки, Куба, Хачмас, Кюрдмир, Ширван, Аштарак, Армавир, Кош, Мюсера, Очамчыра, Рица, Сухум, Скурча, Батуми, Восточная Грузия, Тбилиси

14.	<i>Epilohmannia cylindrica minima</i> Schuster, 1960.	южная Европа часто	Унцукульский р-н окрестности с. Майданское РД, Пятигорск
15.	<i>Epilohmannia daghestanica</i> Karppinen et Shtanchaeva, 1987	Кавказ	Кизилюрт, Унцукульский р-н окрестности с. Майданское РД
16.	<i>Epilohmannia kulaginae</i> Shtanchaeva, 1993	Кавказ.	окрестности с. Майданское РД, Агдам, Кюрдамир
17.	<i>Mesotritia nuda</i> Berlese, 1887	Семикосмополит: Голарктика Палеарктика: менее часто на севере, и Неарктика: часто, Эфиопская область Южная Африка и север Неотропической области	Сочи, Самур, окрестности с. Майданское РД, Цумилух, Исмаиллы, Севан, Рица, Сакен, Скурча
18.	<i>Acrotritia ardua ardua</i> Koch, 1841	Космополит часто.	Абрау, Майкоп, Пятигорск, Башиль, Лагонаки, Буйнакск, Хив, Гоквари, Гуниб, Махачкала, Межгюль, Нюгди, Самур, окрестности с. Майданское РД, Цумилух, Закаталы, Исмаиллы, Гирканский заповедник, Талыш, Ширван, Дилижан, Салах, Севан, Ауадхара, Бзыбь, Келавсур, Мюсера, Новый Афон, Очамчыра, Скурча, Батуми, Алгети, Гоготури, Цхиниори, Годержи, Дидваке, Черное озеро, Гомборский хребет, Кинтриши, Хино, Хашури
19.	<i>Acrotritia ardua monodactyla</i> Niedbała, 2002	Неотропическая область и южная Палеарктика Кавказ.	окрестности с. Майданское РД, Гоготури
20.	<i>Acrotritia duplicata</i> Grandjean, 1953	Палеарктика часто и Вьетнам.	Владикавказ, Северная Осетия, Ширван, Унцукульский р-н, окрестности селений Майданское, Аракани, Балахани и Моксох РД
21.	<i>Euphthiracarus monodactylus</i> Willmann, 1919	Голарктика западная Палеарктика: менее часто на севере, и Неарктика: исключая юг и Новая Гвинея.	окрестности селений Аракани и Моксох РД, Ростов, Теберда, Дагестан, Хоста, Моздок, Северная Осетия, Чегет, Межгюль, Дербент, Самур, Хебда, Агдам, Гянджа, Исмаиллы, Ауадхара, Бзыбь, Рица, Сакен, Скурча, Батуми, Хашури,

22.	<i>Atropacarus ochraceus</i> Niedbała, 1983	восточное Средиземноморье.	Сочи, окрестности с. Майданское РД, Батуми, Грузия, Сатапли, Хашури.
23.	<i>Atropacarus phyllophorus</i> Berlese, 1904	центральная и южная Европа и Вьетнам.	Гуниб, Самур, окрестности с. Моксох РД, Исмаиллы, Бзыбь, Алгети, Батуми, Гомборский хребет, Тбилиси, Хашури.
24.	<i>Atropacarus striculus</i> Koch, 1983	Семикосмополит Голарктика: часто, Мексика, Восточная область и Австралийская область: Гавайские о-ва.	окрестности с. Моксох и Балахани РД, Абрау, Северная Осетия, Моздок, Чегет, Ахты, Гоквари, Гуниб, Цовкра, оз. Гек-Гель, Исмаиллы, Ленкорань, Гирканский заповедник, Ауадхара, Алгети, Гоготури, Годержи, Гомборский хребет, Испани, Набада
25.	<i>Phthiracarus P. laevigatus</i> Koch, 1841	Палеарктика менее часто на севере, Перу и о. Св. Елены	окрестности селений Майданское, Аракани, Балахани и Моксох РД, Теберда, Северная Осетия, Ауадхара, Мюсера, Сухум, Дманиси, Бако, Хино
26.	<i>Phthiracarus P. longulus</i> Koch, 1841	Голарктика.	Домбай, Чегет, Башиль, Гоквари, Гуниб, Самур, окрестности с. Майданское РД, Цовкра, Цумилух, Закаталы, Дилижан, Салах, Ауадхара, Батуми
27.	<i>Phthiracarus P. sphaerulus</i> Banks, 1895	Голарктика.	Хоста, Чегет, Башиль, окрестности с. Майданское РД, Закаталы, Дилижан, Севан, Скурча, Батуми
28.	<i>Steganacarus S. spinosus spinosus</i> Sellnick, 1920	Европа.	Араканское ущелье с. Аракани РД, Сочи, Теберда, Ленкорань, Салах, Бако, Батуми, Гомборский хребет, Дидваке, Кинтриши, Хино, Гоготури, Королистави, Цхиниори, Испани
29.	<i>Steganacarus Tropacarus carinatus carinatus</i> Koch, 1841	Палеарктика менее часто на севере и Индия Кашмир.	Абрау, Буйнакск, Берикей, Терско-Сулакская низменность, Хив, Самур, Араканское ущелье с. Аракани РД, Ленкорань, Гирканский заповедник, Шеки, Мюсера, Рица, Скурча, Сухум, Алгети, Батуми, Бако, Гомборский хребет, Лагодехи, М. Поти, Королистави, Цхиниори, Тбилиси
30.	<i>Steganacarus Tropacarus lucidus</i> Sergienko, 1994	восточное Средиземноморье.	Башиль, Гуниб, окрестности с. Майданское РД, Тальш, Рица, Хашури
31.	<i>Trhypochthonius tectorum tectorum</i> Berlese, 1896	Голарктика часто, Восточная область юго-восточный Китай и Сикким и Перу	Домбай, Чегет, Гоквари, Гуниб, Леваша, Кумух, Куруш, Махачкала, Межгюль, Прикаспийская низменность, Терско-Кумская низменность, окрестности селений Балахани и Моксох РД, Цумилух, Гаджикент, оз. Гек-Гель, Закаталы, Кельбаджар, Чирагедзор, Шеки, Карабах, Ауадхара, Келавсур, Рица, Алгети, Бакуриани, Боржоми, Дманиси, Батуми, Верхняя Картли, Джвари, Колхида, Восточная Грузия, Гомборский хребет, Манглиси,

			Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет, Цагвери, Цихисджвари
32.	<i>Malacoethrus monodactylus</i> Michael, 1888	Голарктика часто и Неотропическая область.	окрестности селений Аракани и Моксох РД Цовкра, Талыш, <b>Рица</b>
33.	<i>Malacoethrus processus</i> Hammen, 1952	Европа.	Хоста, Гоквари, окрестности с. Майданское РД, Хив, Закаталы, Исмаиллы, Куба, Талыш, Келавсур, Мюсера, Рица, Сакен, Батуми, Сатапли
34.	<i>Trimalacoethrus T. tardus</i> Michael, 1888	Палеарктика исключая север и Неарктика США: Северная Каролина, и Канада.	Сочи, Теберда, Дагестан, <b>Кизилюрт</b> , Махачкала, окрестности с. Майданское РД
35.	<i>Nothrus anauniensis</i> Canestrini et Fanzago, 1876	Космополит исключая Антарктику: часто в Палеарктике.	Ростов, Пятигорск, Теберда, Северная Осетия, Владикавказ, окрестности с. Майданское РД, Буйнакск, Левашы, Махачкала, Микрах, Тлярата, Цумилух, Апшерон, Исмаилы, Талыш, Арагац, Кош, Закаталы, Куба, Хачмас, Карабах, Ширван, Мюсера, Рица, Скурча, Сухум, Ходжала, Очамчыра, Бзыбь, Келавсур, Казбеги, Кутаиси, Верхняя Картли, Бакуриани, Боржомы, Цагвери, Восточная Грузия, Манглиси, Тбилиси, Мтацминда, Триалетский хребет, Батуми, Бакуриани, Боржомы Делиси, Дманиси, Тбилиси, Чорохи
36.	<i>Nothrus borussicus</i> Sellnick, 1928	Голарктика часто в Палеарктике.	Теберда, Гоквари, Гуниб, Домбай, Тлярата, Цумилух, Куруш, окрестности с. Майданское, Моксох, Аракани РД, Самур, Алгети, Верхняя Картли, Колхида, Триалетский хребет, Восточная Грузия, Гомборский хребет, Манглиси, Казбеги, Крестовый перевал, Марткоби, Тбилиси
37.	<i>Nothrus pratensis</i> Sellnick, 1928	Голарктика менее часто на юге.	окрестности с. Моксох, РД, Гуниб, Куруш, оз. Гек-Гель, Гянджа, Закаталы, Кельбаджар, Чирагедзор, Шеки, Батуми, Колхида, Восточная Грузия, Испани, Набада, Мтацминда, Поты, Тбилиси, Триалетский хребет
38.	<i>Camisia C. biverrucata</i> Koch, 1839	Голарктика часто в Палеарктике.	Ростов, Теберда, Гоквари, Самур, окрестности с. Майданское РД, Цовкра, Куба, Хачмас, Апшерон, Бзыбь, Мюсера, Рица, Восточная Грузия, Дманиси, Мтацминда, Сагурамо, Тбилиси, Триалетский хребет, Фушуркаули
39.	<i>Camisia C. horrida</i> Hermann, 1804	Голарктика часто, север Восточной области и Центральная Америка.	окрестности с. Моксох, РД Абрау, Теберда, Чегет, Куруш, Закаталы, Гаджикент, оз. Гек-Гель, Кельбаджар, Чирагедзор, Шеки, Карабах, Мюсера, Рица, Скурча, Алгети, Верхняя Картли, Восточная Грузия, Делиси, Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет

40.	<i>Camisia spinifer</i> Koch, 1839	Семикосмополит Голарктика: часто, север Восточной области и Неотропическая область: Бразилия и Панама.	окрестности с. Балахани, РД Домбай, Гоквари, Кумух, Исмаиллы, Ленкорань, Куба, Хачмас, Апшерон, Рица, Восточная Грузия, Манглиси, Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет
41.	<i>Heminothrus H. targionii</i> Berlese, 1885	Голарктика часто в Палеарктике, юго-восточный Китай и Панама.	Пятигорск, Домбай, Северная Осетия, Тлярата, Цумилух, окрестности с. Аракани, РД, Гаджикенд, оз. Гек-Гель, Закаталы, Кельбаджар, Чирагедзор, Шеки, Карабах, Бзыбь, Рица, Сакен, Скурча, Боржом, Восточная Грузия, Триалетский хребет, Хашури
42.	<i>Heminothrus Platynothrus peltifer</i> Koch, 1839	Семикосмополит Голарктика: часто, север Восточной области, Австралийская область: Новая Зеландия, север Неотропической области и о. Св. Елены.	Кавказ, Домбай, Северная Осетия, Чегет, Башиль, Лагонаки, Гоквари, окрестности с. Моксох РД, Гуниб, Кули, Куруш, Самур, Тлярата, Цовкра, Цумилух, Куба, Хачмас, Апшерон, Ленкорань, Шеки, Закаталы, Исмаиллы, Гирканский заповедник, Хачмас, Арагац, Армавир, Севан, Ауадхара, Келавсур, Мюсера, Очамчыра, Рица, Сакен, Скурча, Ходжала, Бакуриани, Бако, Годержи, Кинтриши Кокотаури, Цагвери, Хихидзири, Цихисджвари, Батуми, Восточная Грузия, Манглиси, Тбилиси, Гоготури, Гомборский хребет, Испани, Набада, Колхида, Лагодехи, Поты, Сатапли, Триалетский хребет
43.	<i>Masthermannia mammillaris</i> Berlese, 1904	Тропическая исключая Эфиопскую область и субтропическая зоны	Сочи, Ростов, окрестности с. Моксох РД, Рица
44.	<i>Nanhermannia (Nanhermannia) dorsalis</i> Banks, 1896	Голарктика и Неотропическая область.	Дылым, окрестности с. Майданское, РД
45.	<i>Nanhermannia (Nanhermannia) elegantula</i> Berlese, 1913	Голарктика и о. Св. Елены.	Сочи, Теберда, окрестности с. Майданское, РД, Ауадхара, Мюсера, Новый Афон, Ходжала, Рица, Батуми, Лагодехи
46.	<i>Nanhermannia Nanhermannia nana</i> Nicolet, 1855	Семикосмополит Голарктика: часто Неотропическая область, север Восточной области, Новая Зеландия, о. Св. Елены и	Ростов, Теберда, Лагонаки, Гоквари, окрестности с. Моксох и Аракани РД, Цумилух, Ленкорань, Куба, Хачмас, Талыш, Ауадхара, Закаталы, Рица, Сакен, Сухум, Анаклия, Дедабери, Эцери, Набада, Парто Цхали 9, Бако, Хихадзири, Хино, Батуми, Восточная Грузия, Тбилиси, Гоготури, Цхиниори, Гомборский хребет, Крестовый

		Антарктика.	перевал, Лагодехи, Триалетский хребет, Сатапли
47.	<i>Hermanniella granulata</i> Nicolet, 1855	Голарктика Палеарктика: менее часто на севере, и северо-восток США.	окрестность с. Аракани РД, Дылым, Ростов, Терско-Кумская низменность, Апшерон, Ленкорань, Мингечаур, Чирагедзор, Кельбаджар, Сальяны, Куба, Хачмас, Мюсера, Ходжала, Делиси, Потти, Боржом, Цагвери, Восточная Грузия, Колхида, Верхняя Картли, Кутаиси, Гомборский хребет, Дидваке, Хино, Мтацминда, Лагодехи, Тбилиси, Триалетский хребет
48.	<i>Hermanniella picea</i> Koch, 1839	Голарктика Палеарктика: менее часто на севере, и США: Вирджиния, северо-восток Восточной области и Филиппины.	Абрау, Северная Осетия, Моздок, Башиль, Гоквари, Дылым, Махачкала, окрестности с. Моксох, Балахани и Аракани РД, Гаджикент, оз. Гек-Гель, Закаталы, Кельбаджар, Чирагедзор, Карабах, Ленкорань, Дилижан, Салах, Севан, Мюсера, Рица, Ходжала, Алгети, Батуми, Восточная Грузия, Сагурамо, Гомборский хребет, Дидваке, Кинтриши, Хино, Гоготури, Королистави, Цхиниори, Тбилиси, Чхутунети
49.	<i>Hermanniella serrata</i> Sitnikova, 1973	Палеарктика восточное Средиземноморье и восток азиатской части России.	Сочи, Теберда, Северная Осетия, Гуниб, окрестности с. Майданское РД, Скурча, Батуми, Хашури
50.	<i>Neoliodes theleproctus</i> Hermann, 1804	Семикосмополит Палеарктика: менее часто на севере, Восточная область: Вьетнам, и Австралийская область: Новая Гвинея и Гавайские о-ва.	Ростов, Абрау, Буйнакск, Дербент, Самур, Сарыкум, Махачкала, окрестности с. Майданское РД, Карашамб, Бакуриани, Боржом, Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет, Цагвери, Цеми, Цихисджвари
51.	<i>Licnodamaeus costula</i> Grandjean, 1931	Средиземноморье.	Буйнакск, Дагестан, окрестности с. Майданское РД
52.	<i>Licnodamaeus pulcherrimus</i> Paoli, 1908	Палеарктика исключая север.	Ростов, Новороссийск, Пятигорск, Сочи, Дагестан, Абрау, Геленджик, Домбай, Буйнакск, Махачкала, Межгюль, Нюгди, Самур, окрестности с. Балахани РД, Закаталы, Тальш, Мюсера, Рица, Сакен, Пицунда, Восточная Грузия
53.	<i>Licnodamaeus undulatus</i> Paoli, 1908	Палеарктика исключая север и Тайвань.	Ростов, Теберда, Северная Осетия, окрестности с. Майданское РД, Астара, Апшерон, Куба, Хачмас, Кельбаджар, Ленкорань, Бзыбь, Бако, Кватия, Мост Неней, Хихадзири, Бакуриани, Боржом, Восточная Грузия, Мтацминда,



			Тбилиси, Триалетский хребет, Цагвери
54.	<i>Gymnodamaeus bicostatus</i> Koch, 1835	Голарктика.	Северная Осетия, Майкоп, окрестности с. Майданское РД, Ленкорань, Шеки, Бзыбь, Сухум, Мюсера, Рица, Сакен, Верхняя Картли, Восточная Грузия, Делиси, Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет
55.	<i>Jacotella frondeus</i> Kulijev, 1979	восточное Средиземноморье	окрестности с. Майданское РД, Буйнакск, Кизилюрт, Тальш, Карашамб
56.	<i>Belba meridionalis</i> Bulanova-Zachvatkina, 1962	южная Палеарктика Средиземноморье и юго-восточная Палеарктика.	Сочи, окрестности с. Майданское РД, Исмаиллы, Карашамб
57.	<i>Damaeus D.</i> sp.	Кавказ.	окрестности с. Балахани и Аракани РД
58.	<i>Damaeus Paradamaeus clavipes</i> Hermann, 1804	западная Палеарктика часто	Теберда, Северная Осетия, окрестности с. Моксох РД
59.	<i>Metabelba M. papillipes</i> Nicolet, 1855	Голарктика западная Палеарктика: менее часто на севере, Западная Сибирь и США.	окрестности с. Моксох РД, Сочи, Хоста, Домбай, Северная Осетия, Батуми, Гоготури, Хино
60.	<i>Metabelba M. pulverulenta</i> Koch, 1839	Голарктика Палеарктика: часто, и США: Вирджиния	Ростов, Домбай, Северная Осетия, Моздок, Гоквари, Гуниб, окрестности с. Моксох и Балахани РД, Бзыбь, Сакен, Скурча, Алгети, Бако, Хино, Чорохи, Бакуриани, Боржоми, Цихисджвари, Делиси, Дманиси, Верхняя Картли, Восточная Грузия, Гомборский хребет, Манглиси, Сагурамо, Мтацминда, Опурчхнети, Тбилиси, Триалетский хребет
61.	<i>Metabelbella macerochaeta</i> Bulanova-Zachvatkina, 1967	восточное Средиземноморье.	Сочи, Теберда, окрестности с. Балахани РД, Терско-Кумская низменность, Апшерон, Куба, Хачмас, Мюсера, Ходжала, Пицунда, Рица, Скурча, Бакуриани, Батуми, Боржоми, Восточная Грузия, Манглиси, Гомборский хребет, Сатапли, Триалетский хребет, Чхутунети
62.	<i>Subbelba partiocrispa</i> Bulanova-Zachvatkina, 1967	Палеарктика.	окрестности с. Моксох и Балахани РД
63.	<i>Microzetorches emeryi</i> Coggi, 1898	центральная и южная Палеарктика.	Ростов, Сочи, окрестности с. Майданское РД, Буйнакск, Сухум, Тбилиси
64.	<i>Cultroribula</i>	южная Европа	Батуми, окрестности с. Аракани РД

	<i>confinis</i> Berlese, 1908		
65.	<i>Ceratoppia quadridentata</i> Haller, 1882	Голарктика Палеарктика: часто, и северная Неарктика и юго- восточный Китай.	Абрау, Майкоп, Пятигорск, Владикавказ, Северная Осетия, Домбай, Чегет, Буйнакск, Гоквари, Гуниб, Куруш, Махачкала, окрестности с. Моксох и Аракани РД, Закаталы, Исмаиллы, Ленкорань, Кура-Араксинская низменность, Талыш, Сальяны, Дилижан, Салах, Мюсера, Рица, Сакен, Сухум, Ходжала, Батуми, Казбеги, Сатапли, Хашури, Хино
66.	<i>Ceratoppia</i> sp.	Кавказ.	окрестности с. Аракани РД
67.	<i>Adoristes ovatus ovatus</i> Koch, 1839	Палеарктика западная: часто, и центральная и западная Азия	Майкоп, Буйнакск, Межгюль, Самур, окрестности с. Майданское РД, Цумилух, Ленкорань, Мюсера, Рица, Ходжала, Боржом, Бакуриани, Восточная Грузия, Дманиси, Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет, Цагвери, Цеми
68.	<i>Birsteinus perlongus</i> Krivolutsky, 1965	южная Палеарктика восточное Средиземноморье; восточная и южная Палеарктика.	окрестности с. Майданское РД, Буйнакск
69.	<i>Liacarus L. brevilamellatus</i> Mihelčič, 1955	Средиземноморье.	Сочи, Дагестан, окрестности с. Моксох и Аракани РД Домбай, Теберда, Чегет, Лагонаки, Северная Осетия, Буйнакск, Новый Чиркей, Тлярата, Цумилух, Самур, Исмаиллы, Ленкорань, Гирканский заповедник, Массалы, Талыш, Ширван, Арагац, Арарат, Варденис, Дилижан, Севан, Ауадхара, Рица, Сакен, Скурча, Сухум, Боржом, Бакуриани, Верхняя Картли, Коджори, Цхнети, Восточная Грузия, Гомборский хребет, Делиси, Кватия, Кокотаури, Лагодехи, Мтацминда, Пасанаури, Тбилиси, Триалетский хребет, Хашури, Цагвери
70.	<i>Liacarus L. xylariae xylariae</i> Schrank. 1803	Палеарктика часто.	Теберда, Северная Осетия, Чегет, Башиль, Берикей, окрестности с. Майданское и Балахани РД, Кумух, Тлярата, Цумилух, Гуниб, Махачкала, Дылым, Куруш, Самур, Цумада, оз. Гек-Гель, Гянджа, Кельбаджар, Ленкорань, Чирагедзор, Талыш, Малый Каказ, Исмаиллы, Карабах, Мровдагский хребет, Карашамб, Салах, Севан, Бзыбь, Сухум, Ходжала, Мюсера, Рица, Сакен, Батуми, Боржом, Бакуриани, Брили, Жинвали, Маткоби, Душети, Коджори, Цхинвали, Цхнети, Мцхета, Сагурамо, Тбилиси, Триалетский хребет
71.	<i>Liacarus L. sp.</i>	Кавказ.	окрестность с. Аракани РД

72.	<i>Liacarus Dorycranosus acutus</i> Pschorn-Walcher, 1951	западная Палеарктика менее часто на севере.	Ростов, Теберда Дагестан, окрестности с. Моксох и Аракани РД, Северная Осетия, Моздок, Куруш, Махачкала, Самур, Ширван
73.	<i>Liacarus Dorycranosus punctulatus</i> Mihelčič, 1956	Средиземноморье.	Ростов, Сочи, Дагестан, окрестности с. Майданское РД, Северная Осетия, Дылым, Гаджикенд, оз. Гек-Гель, Гянджа, Кельбаджар, Чирагедзор, Мюсера, Боржоми, Бакуриани, Цагвери
74.	<i>Liacarus Dorycranosus splendens ssp.</i>	Кавказ.	Унцукульский район РД, Самур, Дилижан, Батуми, Хашури
75.	<i>Xenillus discrepans</i> Grandjean, 1936	южная Палеарктика Средиземноморье и центральная и западная Азия.	Сочи, Дагестан, окрестности с. Майданское РД, Лагонаки, Берикей, Гуниб, Махачкала, Самур, Глярата, Цумилух, Унцукуль, Закаталы, Кельбаджар, Шеки, Рица, Мюсера, Сакен, Скурча, Восточная Грузия, Манглиси, Сагурамо, Тбилиси, Дманиси
76.	<i>Xenillus sculptrus</i> Kulijev, 1963	Кавказ.	Сочи, Гуниб, окрестности с. Майданское РД, Большой и Малый Кавказ, оз. Гек-Гель, Чирагедзор, Исмаиллы, Гирканский заповедник, Бзыбь, Очамчыра, Ахалкалаки, Бабанеури, Бакуриани, Боржоми, Делиси, Игоети, Каралети, Меджврисхеви, Патара Лило, Скра, Удзо, Цеми, Цхинвали, Цхнети, Батуми, Верхняя Картли, Делиси, Тбилиси, Сатапли
77.	<i>Xenillus tegeocranus</i> Hermann, 1804	Палеарктика часто и юго-восточный Китай.	Ростов, Домбай, Абрау, Чегет, Башиль, Северная Осетия, окрестности с. Моксох и Аракани РД, Буйнакск, Берикей, Левашы, Махачкала, Межгюль, Самур, Апшерон, Агдам, Гянджа, Кяляба, Мингечаур, Сальяны Шеки, Куба, Хачмас, Ленкорань, Талыш, Ширван, Салах, Бзыбь, Ходжала, Мюсера, Рица, Сакен, Сухум, Батуми, Бакуриани, Боржоми, Цагвери, Гоготури Королистави, Цхиниори, Гомборский хребет, Дидваке, Хино, Кинтриши, Тбилиси, Сатапли, Хашури.
78.	<i>Eremaeus hepaticus cordiformis</i> Grandjean, 1934	Средиземноморье.	Теберда, Чегет, Башиль, Гоквари, Гуниб, Межгюль, Самур, окрестности с. Майданское РД, Цумилух, Закаталы, Дилижан, Севан, Салах, Ауадхара
79.	<i>Eueremaes oblongus</i> Koch, 1835	Голарктика часто и юго-восточный Китай.	Северная Осетия, Моздок, окрестности с. Майданское РД, Самур, Апшерон, Куба, Хачмас, Закаталы, Ленкорань, Кельбаджар, Шеки, Мюсера, Рица, Сакен, Скурча, Ходжала, Бакуриани, Боржоми, Цеми, Цихисджвари, Батуми, Верхняя Картли, Гомборский хребет, Делиси, Восточная Грузия, Манглиси,

			Сагурамо, Дманиси, Крестовый перевал, Мтацминда, Мцхета, Тбилиси, Триалетский хребет, Хашури
80.	<i>Ctenobelba pilosella</i> Jeleva, 1962	южная Европа.	Сочи, Дагестан, Северная Осетия, Дылым, Махачкала, Самур, окрестности с. Аракани РД, Талыш, Мюсера, Скурча, Батуми, Мтацминда, Тбилиси, Чхутунети
81.	<i>Damaeolus ornatissimus</i> Csiszár, 1962	Палеарктика южная Средиземноморье и центральная и западная Азия.	Сочи, Теберда, Дагестан, Хоста, Новороссийск, Абрау, Геленджик, Башиль, Ахты, Буйнакск, Кумух,, Гуниб, Куруш, Махачкала, Межгюль, Самур, окрестности с. Моксох РД, Цумилух, Астара, Закаталы, Исмаиллы, Ленкорань, Гирканский заповедник, Талыш, Ауадхара, Бзыбь, Мюсера, Новый Афон, Рица, Сакен, Сухум, Батуми, Бако, Кокотаури, Хино, Чхутунети, Чорохи, Гомборский хребет, Дидваке, Кинтриши, Королистави, Цхиниори, Сагурамо, Сатапли, Хашури
82.	<i>Fosseremus laciniatus</i> Berlese, 1905	Космополит исключая Антарктику: часто.	Северная Осетия, Владикавказ, Ахты, Гоквари, Гуниб, Кизилюрт, Самур, Унцукульский район РД, Цумилух, Закаталы, Исмаиллы, Карабах, Ленкорань, Гирканский заповедник, Талыш, Ауадхара, Бзыбь, Рица, Скурча, Батуми, Восточная Грузия, Мтацминда, Сагурамо, Сатапли, Тбилиси, Триалетский хребет
83.	<i>Pantelozetes paolii</i> Oudemans, 1913	Голарктика западная Палеарктика: часто, центральная и западная Азия и северная Неарктика и Ява.	Ростов, Теберда, Северная Осетия, Моздок, окрестности с. Моксох РД, Гуниб, Самур, Тлярата, Цумилух, Цумада, Дилижан, Карашамб, Ауадхара, Азох, Восточная Грузия, озеро Кель, Крестовый перевал
84.	<i>Oppia nitens</i> Koch, 1836	Голарктика западная Палеарктика: менее часто на севере, центральная и западная Азия и восточная Неарктика.	Ростов, Сочи, окрестности с. Майданское РД, Исмаиллы, Талыш, Араратская долина Лори-Памбак, Севан, Сакен, Сухум, Анаклия, Батуми, Восточная Грузия, Дманиси, Манглиси, Сагурамо, Сатапли
85.	<i>Ramusella R. puertomontensis</i> Hammer, 1962	Тропическая зона Индия: Западная Бенгалия, Меланезия: о. Фиджи, и Чили и южная Палеарктика Средиземноморье и восток азиатской	Хоста, Пятигорск, Чегет, Ахты, Брянская коса, Гуниб, Межгюль, Нюгди, Самур, окрестности с. Майданское РД, Тюлений, Цовкра, Цумада, Цумилух, Закаталы, Исмаиллы, Гирканский заповедник, Талыш, Ауадхара, Бзыбь, Батуми, Сатапли, Хашури

		части России.	
86.	<i>Ramusella Insculptoppia insculpta</i> Paoli, 1908	западная Палеарктика исключая север: часто, восточная Палеарктика восточная часть восточной Палеарктики и Иран и Вьетнам.	Сочи, Ростов, Хоста, Теберда, Северная Осетия, Моздок, Буйнакск, Берикей, Кумух, Леваши, Махачкала, Новый Чиркей, Самур, Тарумовка, Цумилух, Куруш, Терско-Кумская низменность, Унцукульский р – н РД, Агдам, Закаталы, Малый Кавказ, Талыш, Карабах, Кура-Араксинская низменность, Сальяны, Бзыбь, Мюсера, Сакен, Скурча, Сухум, Рица, Ходжала, Алгети, Батуми, Восточная Грузия, Сагурамо, Гомборский хребет, Дидваке, Кинтриши, Дманиси, Королистави, Цхиниори, Кулеви, Сикча, Лагодехи, Тбилиси, Хино, Хихадзири, Чорохи, Чхутунети
87.	<i>Ramusella Rectoppia fasciata</i> Paoli, 1908	Палеарктика центральная и южная Европа и Корея, США Флорида, Сомали, Индия, Трипур и о. Амстердам.	Дагестан, Новый Чиркей, Самур, Махачкала, окрестности с. Майданское РД, Гирканский заповедник, Сальяны, Мюсера, Триалетский хребет
88.	<i>Discoppia Cyliandroppia cylindrica</i> Pérez-Íñigo, 1965	Палеарктика менее часто на севере и Панама.	Ростов, Сочи, Дагестан, Сарыкум, Брянская коса, Тюлений, Леваши, Сарыкум, Тарумовка, Куруш, Крайновка, Терско-Кумская низменность, окрестности с. Майданское РД, Карабах, Ширван, Мюсера, Хашури
89.	<i>Micropoppia minus minus</i> Paoli, 1908	Космополит часто в Палеарктике.	Хоста, Теберда, Домбай, Лагонаки, Майкоп, Северная Осетия, Моздок, Ахты, Гоквари, Гуниб, Брянская коса, Тюлений, Куруш, Леваши, Межгюль, Тарумовка, Нюгди, Крайновка, Терско-Кумская низменность, Унцукульский район, РД, Хив, Цумилух, Чираг, Апшерон, Куба, Хачмас, Закаталы, Ленкорань, Гирканский заповедник, Талыш, Ширван, Абовян, Арагац, Ауадхара, Бзыбь, Пицунда, Мюсера, Рица, Скурча, Ходжала, Батуми, Восточная Грузия, Манглиси, Сагурамо, Дманиси, Крестовый перевал, Сатапли, Хашури
90.	<i>Micropoppia minus longisetosa</i> Subías et Rodríguez, 1988	Средиземноморье и Аргентина	Хоста, Домбай, Гоквари, Межгюль, Нюгди, окрестности с. Майданское РД, Цумилух, Закаталы, Гирканский заповедник, Талыш, Ауадхара, Бзыбь, Батуми, Хашури
91.	<i>Rhinoppia bulanovae bulanovae</i> Kulijev, 1962	центральная и восточная Европа.	Сочи, Теберда, Дагестан, Домбай, Чегет, Самур, Буйнакск, Берикей, Кизилюрт, Кумух, Леваши, Махачкала, Тлярата, Хебда, Гуниб, окрестности с. Майданское РД, Цумада, Апшерон, Куба, Хачмас, Массалы, Талыш, Ауадхара, Бзыбь, Новый Афон, Батуми, Хашури

92.	<i>Rhinoppia media</i> Mihelčič, 1956	Средиземноморье часто и Перу.	Сочи, Дагестан, окрестности с. Балахани РД, Абрау, Дылым, Куруш, Терско-Кумская низменность, Ленкорань, Мюсера, Алгети, Батуми, Мтацминда, Тбилиси
93.	<i>Rhinoppia nasuta</i> Moritz, 1965	центральная и восточная Европа.	окрестности с. Майданское РД, Годержи, Гомборский хребет
94.	<i>Rhinoppia obsoleta obsoleta</i> Paoli, 1908	Палеарктика, исключая восточную часть восточной Палеарктики: часто, Гренландия и Австралийская область Новая Зеландия и Гавайские о-ва.	Хоста, Лагонаки, Домбай, Чегет, Северная Осетия, Моздок, Крестовый перевал, Ахты, Гоквари, Гуниб, Новый Чиркей, Дербент, Махачкала, Куруш, Самур, окрестности с. Моксох и Аракани РД, Хив, Цумада, Цумилух, Агдам, Гаджикенд, Гянджа, Кельбаджар, Кяляба, Сальяны, Исмаиллы, Куба, Хачмас, Ленкорань, Гирканский заповедник, Талыш, Бзыбь, Мюсера, Рица, Сакен, Скурча, Батуми, Лагодехи
95.	<i>Rhinoppia subpectinata</i> Oudemans, 1900	Голарктика: исключая восточную часть восточной Палеарктики часто в западной Палеарктике, и Сенегал.	Ростов, Сочи, Дагестан, Махачкала, окрестности с. Моксох, Балахани и Аракани РД, Хоста, Теберда, Майкоп, Северная Осетия, Крестовый перевал, Моздок, Гуниб, Берикей, Кизилюрт, Махачкала, Самур, Куруш, Крайновка, Терско-Кумская низменность, Цумилух, Агдам, Гянджа, Кельбаджар, Ленкорань Чирагедзор, Шеки, Ленкорань, Массалы, Апшерон, Куба, Хачмас, Талыш, Келавсур, Мюсера, Пицунда, Рица, Сакен, Ходжала, Бакуриани, Боржом, Батуми, Восточная Грузия, Манглиси, Сагурамо, Тбилиси, Гоготури, Королистави, Гомборский хребет, Дидваке, Сера Босели, Хино, Кинтриши, Кокотаури, Фуртио, Черное озеро, Чорохи, Чхутунети, Колхида, Лагодехи, Пот, Триалетский хребет, Чурия
96.	<i>Rhinoppia vera</i> Mihelčič, 1956	Средиземноморье.	Кули, окрестности с. Майданское РД, Цумилух, Закаталы, Гирканский заповедник, Бзыбь, Батуми, Сатапли, Хашури
97.	<i>Berniniella bicarinata</i> Paoli, 1908	Палеарктика часто и Вьетнам.	Хоста, Пятигорск, Чегет, Лагонаки, Северная Осетия, Крестовый перевал, окрестности с. Майданское, Моксох, Балахани и Аракани РД, Ахты, Гоквари, Кули, Кумух, Леваш, Куруш, Цовкра, Цумада, Цумилух, Чираг, Закаталы, Кельбаджар, Ленкорань, Салах, Ауадхара, Бзыбь, Мюсера, Рица, Сакен, Сухум, Ходжала, Батуми, Гомборский хребет, Сатапли, Хашури, Хино
98.	<i>Berniniella silvatica silvatica</i> Vasiliu et	южная Европа исключая западную часть.	Сочи, окрестности с. Аракани РД, Кумух, Хив, Куруш, Межгюль, Закаталы, Исмаиллы, Шеки

	Călugăr, 1976		
99.	<i>Lauropia falcata</i> Paoli, 1908	Палеарктика западная Палеарктика: менее часто на юге, и восточная часть азиатской части России.	Северная Осетия, Агдам, Кура-Араксинская низменность, Мюсера, Восточная Грузия, Сагурамо, Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет, окрестности с. Моксох и Балахани РД
100	<i>Lauropia fallax</i> Paoli, 1908	Семикосмополит Голарктика: часто в западной Палеарктике; Индия: Уттар, Прадеш; Новая Зеландия и Чили.	Абрау, окрестности с. Моксох и Аракани РД, Прикаспийская низменность, Терско-Кумская низменность, Акстафа, Гянджа, Ленкорань, Шеки, Карабах, Бакуриани, Цагвери, Бако, Годержи, Батуми, Верхняя Картли, Гоготури Королистави, Хино, Цхиниори, Дедабера, Парто Цхали, Гомборский хребет, Делиси, Лагодехи, Сера Босели, Триалетский хребет
101	<i>Lauropia tenuipectinata</i> Subías et Rodríguez, 1988	южная Палеарктика	Домбай, Чегет, Гоквари, Самур, окрестности с. Майданское РД, Цумилух, Закаталы, Гирканский заповедник, Исмаиллы, Дилижан, Севан, Ауадхара, Бзыбь, Батуми, Сатапли, Хашури
102	<i>Lauropia</i> sp.	Кавказ.	окрестности с. Майданское РД
103	<i>Moritzoppia M. unicarinata unicarinata</i> Paoli, 1908	Голарктика часто в Палеарктике и Австралийская область.	Ростов, Абрау, Теберда, Северная Осетия, окрестности с. Майданское РД, Куруш, Крайновка, Терско-Кумская низменность, Гуниб, Самур, Тлярата, Цумилух, Апшерон, Куба, Хачмас, Гаджикенд, Кельбаджар, Ленкорань, Шеки, Мюсера, Сухум, Ходжала, Алгети, Восточная Грузия, Сагурамо, Триалетский хребет, Хреити
104	<i>Moritzoppia Moritzoppiella splendens</i> C. L. Koch, 1841	Голарктика.	Домбай, Чегет, окрестности с. Моксох и Аракани РД, Ботлих, Гоквари, Самур, Цумилух
105	<i>Oppiella O. nova nova</i> Oudemans, 1902	Космополит часто.	Абрау, Хоста, Пятигорск, Домбай, Майкоп, Чегет, Башиль, Северная Осетия, Моздок, Крестовый перевал, Ахты, Буйнакск, Берикей, Кизилюрт, Кумух, Махачкала, Гоквари, Гуниб, Куруш, Межгюль, Нюгди, Прикаспийская низменность, Самур, окрестности с. Моксох, Балахани, Майданское и Аракани РД, Цумада, Цумилух, Закаталы, Исмаиллы, Ленкорань, Гирканский заповедник, Тальш, Дилижан, Карашамб, Салах, Севан, Ауадхара, Бзыбь, Келавсур, Мюсера, Новый Афон, Ходжала, Очамчыра, Мюсера, Рица, Сакен, Скурча, Сухум, Бако, Годержи, Мост Неней, Батуми, Восточная Грузия, Манглиси, Гоготури, Королистави, Гомборский хребет, Кинтриши,

			Сера Босели, Хино, Лагодехи, Парто Цхали, Сатапли, Хашури
106	<i>Corynoppia kosarovi</i> <i>kosarovi</i> Jeleva, 1962	Средиземноморье и Панама.	Ростов, окрестности с. Балахани РД, Кизилюрт, Гирканский заповедник
107	<i>Machuella ventrisetosa</i> Hammer, 1961	Тропическая зона, исключая Эфиопскую область и южная Палеарктика.	Нюгди, окрестности с. Майданское РД, Закаталы, Гирканский заповедник, Талыш, Бзыбь, Батуми, Сатапли
108	<i>Quadroppia Coronoquadroppia michaeli</i> Mahunka, 1977	Палеарктика западная менее часто на севере.	Лагонаки, Чегет, Гоквари, Гуниб, Кубачи, Межгюль, Самур, окрестности с. Аракани РД, Цумада, Цумилух, Закаталы, Гирканский заповедник, Талыш, Севан, Бзыбь, Келавсур, Сакен, Батуми, Гомборский хребет, Кинтриши, Королистави, Лагодехи, Сатапли, Тбилиси, Хашури, Черное озеро
109	<i>Quadroppia Coronoquadroppia nasalis</i> Gordeeva, 1983	восточное Средиземноморье.	Сочи, окрестности с. Майданское РД, Хоста, Лагонаки, Махачкала, Кизилюрт, Кумух, Цумилух, Кули, Куруш, Нюгди, Самур, Цовкра, Чираг, Дилижан, Салах, Севан, Гумиста, Аджария
110	<i>Suctobelba flagelliseta flagelliseta</i> Shtanchaeva et Subias, 2009	Кавказ.	Чегет, Гоквари, окрестности с. Майданское РД, Цумилух, Чираг, Гирканский заповедник, Закаталы, Талыш, Бзыбь, Севан, Батуми, Хашури
111	<i>Suctobelba granulata granulata</i> Hammen, 1952	центральная и южная Европа.	Теберда, Северная Осетия, Шеки, Хоста, Чегет, Гоквари, Гуниб, окрестности с. Майданское РД, Самур, Цумада, Цумилух, Чираг, Закаталы, Исмаиллы, Гирканский заповедник, Талыш, Дилижан, Салах, Батуми, Гомборский хребет, Сатапли, Хашури
112	<i>Suctobelba secta</i> Moritz, 1970	центральная и южная Европа.	Самур, окрестности с. Майданское РД
113	<i>Suctobelbella S. acutidens acutidens</i> Forsslund, 1941	Голарктика часто и Аргентина.	Абрау, Чегет, Северная Осетия, Ахты, Гуниб, Куруш, Межгюль, окрестности с. Моксох, Балахани, и Аракани РД, Закаталы, Чирагедзор, Дилижан, Севан, Ауадхара, Бзыбь, Рица, Сакен, Гоготури
114	<i>Suctobelbella S. acutidens duplex</i> Strenzke, 1950	Голарктика Палеарктика: часто, и Канада.	Дагестан, Абрау, Пятигорск, Домбай, Хоста, Чегет, Гоквари, Гуниб, Самур, окрестности с. Майданское РД, Ахты, Межгюль, Куруш, Левашы, Тлярата, Нюгди, Цумада, Цумилух, Закаталы, Шеки, Исмаиллы, Гирканский заповедник, Талыш, Мюсера, Рица, Сухум, Дилижан, Карашамб, Салах, Севан, Ауадхара, Бзыбь, Батуми, Годержи, Гомборский хребет,



			Лагодехи, Сатапли, Тбилиси, Хашури, Хино
115	<i>Suctobelbella S. acutidens sarekensis</i> Forsslund, 1941	Голарктика западная Палеарктика и Неарктика.	Домбай, Чегет, Ахты, Межгюль, Нюгди, Самур, окрестности с. Майданское РД, Цовкра, Цумада, Гирканский заповедник, Закаталы, Ауадхара, Бзыбь, Батуми
116	<i>Suctobelbella S. arcana</i> Moritz, 1970	Голарктика: Палеарктика центральная и южная Европа и восток азиатской части России и Неарктика США: Луизиана, и Канада.	Дагестан, окрестности с. Майданское РД, Чираг, Закаталы
117	<i>Suctobelbella S. granifera</i> Chinone, 2003	Палеарктика Кавказ и Япония.	окрестности с. Майданское РД, Закаталы, Хашури
118	<i>Suctobelbella S. latirostris</i> Strenzke, 1950	Палеарктика Европа и Западная Сибирь и Вьетнам.	Дагестан, Кизилюрт, Кумух, окрестности с. Моксох, Балахани и Аракани РД, Батуми
119	<i>Suctobelbella S. liacariformis</i> Shtanchaeva et Subías, 2009	Кавказ	Чегет, окрестности с. Майданское РД, Исмаиллы, Сатапли
120	<i>Suctobelbella S. longicuspis longicuspis</i> Jacot, 1937	Семикосмополит: Голарктика восточная Неарктика, Европа: часто, и Курильские о-ва, Сальвадор и Новая Зеландия	Северная Осетия, окрестности с. Майданское РД, Королистави
121	<i>Suctobelbella S. subcornigera subcornigera</i> Forsslund, 1941	Семикосмополит: Голарктика часто в Палеарктике, Восточная область и Новая Зеландия	Хоста, Домбай, Чегет, Гоквари, Гуниб, Куруш, Кизилюрт, Махачкала, Межгюль, Нюгди, Самур, окрестности с. Моксох, Балахани, Майданское и Аракани РД, Цумада, Цумилух, Закаталы, Исмаиллы, Ленкорань, Гирканский заповедник, Шеки, Мюсера, Сухум, Батуми, Дилижан, Карашамб, Севан, Ауадхара, Бзыбь, Келавсур, Гомборский хребет, Сатапли, Хашури, Хино, Чорохи
122	<i>Suctobelbella Flagrosuctobella alloenasuta</i> Moritz, 1971	южная Голарктика центральная и южная Европа и США: Северная Каролина.	Северная Осетия, Теберда, Домбай, Гоквари, Дилижан, Севан, Гуниб, окрестности с. Моксох, Майданское и Аракани РД, Закаталы
123	<i>Suctobelbella Flagrosuctobella forsslundi</i>	центральная и южная Европа.	Чегет, Межгюль, окрестности с. Майданское РД, Цумада, Гирканский заповедник, Закаталы, Талыш, Бзыбь, Очамчыра, Скурча, Дилижан,

	<i>moritzi</i> Mahunka, 1987		Сатапли
124	<i>Suctobelbella Flagrosuctobel ba nana</i> Shtanchaeva et Subías, 2009	Кавказ	Ахты, Межгюль, окрестности с Майданское РД, Цумилух, Закаталы, Гирканский заповедник, Талыш, Бзыбь, Хашури
125	<i>Suctobelbella Flagrosuctobel ba nasalis</i> Forsslund, 1941	Палеарктика часто в западной Палеарктике и Новая Зеландия.	Кавказ, Дагестан, Домбай, Северная Осетия, Моздок, Гуниб, окрестности с Моксох РД, Гирканский заповедник, Исмаиллы, Талыш, Гирканский заповедник, Дилижан, Ауадхара, Батуми
126	<i>Suctobelbilla dentata europaea</i> Moritz, 1974	Западная Палеарктика Германия и Кавказ.	окрестности с Майданское РД
127	<i>Carabodes Klapperiches</i> sp. 1	Кавказ.	Межгюль, Нюгди, Самур, окрестности с Майданское РД, Исмаиллы, Гирканский заповедник, Дилижан, Батуми, Хашури
128	<i>Tectocephus velatus velatus</i> Michael, 188	Космополит часто.	Ростов, Абрау, Майкоп, Домбай, Теберда, Лагонаки, Нальчик, Чегет, Северная Осетия, Крестовый перевал, Моздок, Ботлих, Буйнакск, Гиблиб, Гоквари, Гуниб, Дылым, Терско-Сулакская низменность, Дербент, Новый Чиркей, Кизилюрт, Кумух, Махачкала, Самур, Тлярата, Цумилух, Унцукульский район РД, Чох, Цудахар, Цумада, Апшерон, Куба, Хачмас, оз. Гек-Гель, Гянджа, Кельбаджар, Гаджикенд, Сальяны Шеки, Закаталы, Карабах, Ленкорань, Араратская долина, Арагац, Армавир, Гарни, Дилижан, Лори-Памбак, Севан, Ауадхара, Бзыбь 10, Мюсера, Новый Афон, Ходжала Рица, Сакен, Скурча, Сухум, Алгети, Ахарицкали, Бако, Годержи, Кватия, Кокотаури, Фуртио, Хино, Черное озеро, Чорохи, Чхутунети, Бакуриани, Боржом, Цагвери, Цеми, Цихисджвари, Батуми, Восточная Грузия, Гоготури Королистави, Цхиниори, Гомборский хребет, Дидваке, Кинтриши, Дманиси, Казбеги, Колхида, Кулеви, Лагодехи, Манглиси, Мтацминда, Поты, Сагурамо, Тбилиси, Триалетский хребет, Цхалтубо
129	<i>Tectocephus velatus sarekensis</i> Trägårdh, 1910	Космополит часто.	Ростов, Пятигорск, Домбай, Теберда, Чегет, Башиль, Нальчик, Северная Осетия, Крестовый перевал, окрестности с Майданское РД, Буйнакск, Гоквари, Кумух, Махачкала, Микрах, Нюгди, Самур, Терско-Кумская низменность, Тлярата, Цумилух, Гиблиб, Цудахар, Чох, Цумада, Гянджа, оз. Гек-Гель, Гаджикенд,

			Апшерон, Сальяны, Ленкорань, Куба, Хачмас, Апшерон, Карабах, Закаталы, Исмаиллы, Кельбаджар, Чирагедзор, Шеки, Гирканский заповедник, Талыш, Дилижан, Карашамб, Салах, Лори-Памбак, оз. Араратская долина, Севан, Ауадхара, Бзыбь, Рица, Мюсера, Новый Афон, Бзыбь, Ходжала, Сухум, Хашури, Сатапли, Алгети, Батуми, Дманиси, Бако, Годержи, Хихадзири, Черное озеро, Чорохи, Чхутунети, Бакуриани, Боржоми, Восточная Грузия, Манглиси, Сагурамо 9, Гоготури, Казбеги, Колхида, Лагодехи, Поты, Тбилиси, Триалетский хребет
130	<i>Scutovertex minutus</i> Koch, 1836	Палеарктика часто.	Абрау, окрестности с Майданское РД, Избербаш, Махачкала, Куруш, Хив, Апшерон, Куба, Хачмас, Восточная Грузия, Сагурамо, Дманиси, Мтацминда, Тбилиси
131	<i>Scutovertex punctatus</i> Sitnikova, 1975	южная Палеарктика Средиземноморье; центральная и западная Азия.	окрестности с Майданское РД, Куруш
132	<i>Scutovertex sculptus</i> Michael, 1879	Палеарктика менее часто на севере и Новая Зеландия.	Ростов, Теберда, окрестности с Майданское и Моксох РД, Пятигорск, Чегет, Северная Осетия, Крестовый перевал, Брянская коса, Буршак, Гоквари, Куруш, Терско-Кумская низменность, Новый Чиркей, Бзыбь
133	<i>Eupelops acromios</i> Hermann, 1804	Палеарктика часто, север Восточной области и Южная Африка.	Северная Осетия, Крестовый перевал, окрестности с Майданское, Моксох и Аркани РД, Апшерон, Куба, Хачмас, Талыш, Арагац, Рица, Скурча, Алгети, Бакуриани, Боржоми, Восточная Грузия, Сагурамо, Гомборский хребет, Испани, Колхида, Поты, Лагодехи, Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет, Хино, Цеми, Цихисджвари
134	<i>Eupelops tardus</i> Koch, 1835	Палеарктика исключая восточную часть.	Ростов, Новороссийск, Сочи, окрестности с. Моксох и Аркани РД, Теберда, Домбай, Северная Осетия, Ботлих, Гоквари, Гуниб, Цумилух, Бзыбь, Мюсера, Рица, Сакен, Скурча, Бакуриани, Боржоми, Батуми, Верхняя Картли, Марткоби, Восточная Грузия, Дманиси, Кутаиси, Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет, Хашури, Цеми
135	<i>Eupelops torulosus torulosus</i> Koch, 1839	Палеарктика исключая восточную часть: часто.	Сочи, окрестности с Балахани, Моксох и Аркани РД, Пятигорск, Теберда, Домбай, Северная Осетия, Крестовый перевал, Ахты, Буйнакск, Берикей, Дербент, Гоквари, Гуниб, Кумух, Кули, Куруш, Махачкала, Межгюль, Сарыкум, Самур, Цумилух, Чираг, Апшерон, Кипчал, Хачмас, оз. Гек-Гель, Гянджа,

			Кельбаджар, Ленкорань, Чирагедзор, Закаталы, Исмаилы, Тальш, Араратская долина, Лори-Памбак, Дилижан, Севан, Бзыбь, Келавсур, Батуми, Восточная Грузия, Гоготури, Хино, Цхиниори, Гомборский хребет, Лагодехи, Манглиси, Мтацминда, Кутаиси, Сатапли, Тбилиси, Фуртио, Черное озеро, Хашури
136	<i>Peloptulus phaeonotus</i> Koch, 1844	Палеарктика часто.	Ростов, Северная Осетия, Моздок, Крестовый перевал, Буйнакск, Новый Чиркей, Левашы, Махачкала, Гуниб, окрестности с. Майданское, РД, Прикаспийская низменность, Апшерон, Кипчал, Хачмас, Кельбаджар, Шеки, Кош, Алгети, Верхняя Картли, Марткоби, Восточная Грузия, Делиси, Тбилиси, Дманиси, Мтацминда, Триалетский хребет, Хино
137	<i>Achipteria acuta</i> Berlese, 1908	Голарктика Палеарктика: часто; США: Вирджиния.	Майкоп, Лагонаки, Пятигорск, Теберда, Северная Осетия, Крестовый перевал, Буйнакск, Берикей, Кумух, Гоквари, Куруш, Махачкала, Самур, Унцукульский район РД, Исмаиллы, Ауадхара, Бзыбь, Ходжала, Келавсур, Мюсера, Новый Афон, Пицунда, Очамчыра, Рица, Скурча, Сухум, Бако, Мост Неней, Фушуркаули, Черное озеро, Батуми, Гоготури, Гомборский хребет, Дманиси, Лагодехи, Сатапли
138	<i>Achipteria coleoprata</i> Linnaeus, 1758	Голарктика Палеарктика: часто, северная Неарктика, Индия Сикким и о. Св. Елены.	Ростов, окрестности с Майданское и Моксох РД, Крестовый перевал, Рица, Очамчыра, Алгети, Батуми, Бако, Годержи, Дидваке, Хино, Кокотаури, Черное озеро, Чхутунети, Гомборский хребет, Дманиси, Кинтриши, Лагодехи, Манглиси, Матальква, Цхиниори
139	<i>Achipteria italica</i> Oudemans, 1914	Европа.	Новороссийск, Сочи, Дагестан, Домбай, Теберда, Ахты, Буйнакск, Ботлих, Гоквари, Гуниб, окрестности с Майданское РД, Цовкра, Цумада, Цумилух, Ленкорань, Гирканский заповедник, Севан, Ауадхара, Мюсера, Рица, Сухум, Батуми, Восточная Грузия, Манглиси, Лагодехи
140	<i>Achipteria longisetosa</i> Weigmann et Murvanidze, 2003	Кавказ.	окрестности с Майданское РД, Бзыбь, Дидваке, Мачахела, Хино, Чхутунети
141	<i>Scutozetes lanceolatus</i> Hammer, 1952	Голарктика северная Неарктика: часто; западная Палеарктика: восточное Средиземноморье,	Ростов, Домбай, Чегет, Башиль, Гоквари, Гуниб, Куруш Самур, окрестности с Майданское РД, Цовкра, Цумада, Цумилух, Закаталы, Дилижан, Салах, Севан, Гомборский хребет

		восточная Палеарктика: часто и Суринам	
142	<i>Ferolocella cribraria</i> Kulijev, 1977	Кавказ.	окрестности с Майданское РД, Цумилух, Кельбаджар, Рица, Сочи, Бангуриани, Бечо
143	<i>Oribatella O. abdurachmano vi Shtanchaeva et Subías, 2009</i>	Кавказ.	Унцукульский р-н РД, окрестности с. Майданское, Гимринский хребет, г. Зуберха
144	<i>Oribatella O. calcarata</i> Koch, 1835	Голарктика Палеарктика, Канада и США.	окрестности с Майданское и Аракани РД Кумух, Тлярата, Цумилух, Апшерон, Каладуз, Кипчал, Массалы, Закаталы, Хачмас, Дилижан, Араратская долина, Лори-Памбак, Севан, Батуми, Делиси, Верхняя Картли, Тбилиси, Восточная Грузия, Сагурамо, Марткоби, Триалетский хребет
145	<i>Oribatella O.sp.</i>	Кавказ.	окрестности с Майданское и Моксох РД
146	<i>Tectoribates ornatus</i> Schuster, 1958	Палеарктика и Неотропическая область Аргентина и Уругвай.	Ростов, окрестности с Моксох РД, Тарумовка, Хив, Абовян, Армавир, Аштарак, Кош, Карашамб, Восточная Грузия
147	<i>Ceratozetella bregetovae</i> Shaldybina, 1970	южная Палеарктика восточное Средиземноморье и Южная Сибирь.	Ростов, Теберда, Военно-Осетинская дорога, окрестности с Аракани РД, Куруш, Казбеги
148	<i>Ceratozetes conjunctus</i> Mihelčič, 1956	Средиземноморье часто.	Ростов, окрестности с Моксох и Аракани РД, Дербент,, Талыш, Мтацминда, Хашури
149	<i>Ceratozetes laticuspidatus</i> Menke, 1964	центральная и южная Европа часто.	Сочи, Гоквари, Куруш, окрестности с Моксох и Аракани РД, Большой и Малый Кавказ, Карабах, Гирканский заповедник, Талыш, Чирагедзор, Гарни, Сухум, Восточная Грузия, Хашури
150	<i>Ceratozetes minutissimus</i> Willmann, 1951	южная Палеарктика центральная и южная Европа, центральная и западная Азия.	Пятигорск, Северная Осетия, Теберда, Нюгди, Куруш, окрестности с Майданское РД, Чираг, Гирканский заповедник
151	<i>Trichoribates T. novus novus</i> Sellnick, 1928	Голарктика Палеарктика: часто; США: Вирджиния.	Лагонаки, Чегет, Северная Осетия, Гоквари, Гуниб, Махачкала, Куруш, окрестности с Майданское РД, Прикаспийская низменность, Апшерон, Куба, Хачмас, Севан, Рица, Алгети, Бакуриани, Боржоми, Верхняя Картли, Делиси, Лагодехи, Марткоби, Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет, Чхутунети.
152	<i>Trichoribates</i>	Палеарктика юго-	Прикаспийская низменность, окрестности с

	<i>T. punctatus</i> Shaldybina, 1971	восточная Европа и юго-восточная Палеарктика.	Майданское РД
153	<i>Trichoribates</i> <i>Latilamellobate</i> <i>s naltschicki</i> Shaldybina, 1971	восточное Средиземноморье.	Сочи, Теберда, Нальчик, Северная Осетия, окрестности с Майданское РД, Брянская коса, Куруш Новый Чиркей, Леваша, Тлярата, Прикаспийская низменность, Крайновка, Терско-Кумская низменность, Алгети, Гомборский хребет, Казбеги, Лагодехи, Тбилиси, Триалетский хребет
154	<i>Chamobates C.</i> <i>birulai</i> Kuiczinsky, 1092	Палеарктика Европа и северо- восток Сибири	Теберда, Чегет, Северная Осетия, Гоквари, Куруш, окрестности с Майданское РД, Цумада, Салах, Карашамб
155	<i>Chamobates C.</i> <i>caucasicus</i> Shaldybina, 1969	восточное Средиземноморье.	Сочи, Дагестан, Теберда, Красная Поляна, Гвилота, Военно-Осетинская дорога, Северная Осетия, Владикавказ, Буйнакск, Махачкала, Куруш, окрестности с Моксох, Балахани и Аракани РД, Цумилух, Рица, Сакен, Алгети, Бако, Годержи, Кватия, Кокотаури, Фуртио, Фушуркаули, Чорохи, Верхняя Картли, Делиси, Восточная Грузия, Дманиси, Казбеги, Кинтриши, Колхида, Поти, Оपुरчхнети, Тбилиси, Триалетский хребет
156	<i>Minunthozetes</i> <i>pseudofusiger</i> Schweizer, 1922	Палеарктика часто.	Хоста, Домбай, Пятигорск, Лагонаки, Майкоп, Гоквари, Гуниб, Махачкала, Межгюль, окрестности с Майданское РД, Цумада, Чираг, Закаталы, Исмаиллы, Гирканский заповедник, Тальш, Дилижан, Салах, Севан, Ауадхара, Бзыбь 10, Келавсур, Мюсера, Новый Афон, Ходжала, Пицунда, Рица, Сакен, Скурча, Сухум, Бако, Годержи, Хино, Хихадзири, Батуми, Восточная Грузия, Гомборский хребет, Дидваке, Кинтриши, Сера Босели, Испани, Дедабера, Парто Цхали, Эцери, Колхида, Королистави, Цкиниори, Лагодехи, Манглиси, Поти, Сатапли, Хашури
157	<i>Minunthozetes</i> <i>semirufus</i> Koch, 1841	Голарктика:Палеар ктика Палеарктика западная: часто; центральная и западная Азия и Канада.	Теберда, Дагестан, Берикей, Куруш, Самур, окрестности с Майданское РД, Мюсера, Рица, Сакен, Восточная Грузия, Манглиси, Сагурамо, Дманиси, Цкиниори
158	<i>Punctoribates</i> <i>P. minimus</i> Shaldybina, 1969	Палеарктика центральная и южная Европа: исключая запад; центральная и западная Азия	Теберда, Дагестан, Северная Осетия, Башиль, Гоквари, Дылым, Махачкала, окрестности с Майданское РД, Гирканский заповедник, Тальш
159	<i>Punctoribates</i>	Палеарктика	Краснодарский край, Кассарское ущелье, Сочи,

	<i>P. mundus</i> Shaldybina, 1973	восточное Средиземноморье и восточная Палеарктика: исключая север	Теберда, Домбай, Гоквари, Гуниб, Махачкала, окрестности с Майданское РД, Хив, Чираг, Дилижан, Бзыбь
160	<i>Punctoribates</i> <i>P. punctum</i> Koch, 1839	часто; США: Вирджиния; Восточная область и Новая Зеландия	Ростов, Абрау, Теберда, Северная Осетия, Крестовый перевал, Башиль, Чегет, Гиблиб, Кунды, окрестности с Моксох и Аракани РД, Унчукатль, Цуриб, Дербент, Леваша, Махачкала, Новый Чиркей, Куруш, Прикаспийская низменность, Самур, Терско- Кумская низменность, Глярата, Цумилух, Азербайджан, Астара, Апшерон, Куба, Хачмас, Закаталы, Карабах, Кельбаджар, Мингечаур, Сальяны, Шеки, Кура-Араксинская низменность, Ленкорань, Тальш, Арагац, Армавир, Кош, Араратская долина, Лори- Памбак, Севан, Бзыбь, Мюсера, Сухум, Алгети, Ахарицкали, Бако, Годержи, Кокотаури, Хино, Хихадзири, Чхутунети, Батуми, Бакуриани, Боржоми, Верхняя Картли, Кахетия, Шираки, Марткоби, Восточная Грузия, Гомборский хребет, Дманиси, Испани, Парто Цхали, Надаба, Эцери, Казбеги, Кинтриши, Колхида, Кулеви, Матальква, Опурчхнети, Поти, Сикча, Лагодехи, Манглиси, Сагурамо, Мтацминда, Поти, Тбилиси, Триалетский хребет, Цихисджвари, Цкиниори
161	<i>Punctoribates</i> <i>Minguezetes</i> <i>hexagonus</i> Berlese, 1908	Голарктика западная Палеарктика: часто; юго- восточная Палеарктика; северная Неарктика и Вьетнам.	Самур, окрестности с Майданское РД, Агдам, Гянджа, Сальяны, Рица
162	<i>Punctoribates</i> <i>Minguezetes</i> <i>insignis</i> Berlese, 1910	Неотропическая область и субтропическая зона исключая Эфиопскую область	Куруш, окрестности с Майданское РД, Дедабера, Парто Цхали
163	<i>Oribatula O.</i> <i>interrupta</i> <i>interrupta</i> Willmann, 1939	Голарктика Палеарктика и северная Неарктика	окрестности с Майданское РД, Алашар- Бураварский хребет, Массалы, Ленкорань, Шеки, Карашамб
164	<i>Oribatula</i> <i>Zygoribatula</i>	южная Палеарктика часто	Ростов, Дагестан, Гоквари, Новый Чиркей, окрестности с Майданское РД, Цумилух,

	<i>exarata</i> Berlese, 1916		Ленкорань, Сальяны, Арагац, Абовян, Гарни
165	<i>Oribatula</i> <i>Zygoribatula</i> <i>exilis</i> <i>clavatotrichobothria</i> Kulijev, 1962	Кавказ.	Домбай, Чегет, Дагестан, Ботлих, Гоквари, Тлярата, окрестности с Майданское РД, Гаджикенд
166	<i>Oribatula</i> <i>Zygoribatula</i> <i>frisiae</i> Oudemans, 1900	Голарктика часто в южной Палеарктике	Ростов, Маньковка, Пятигорск, Башиль, Северная Осетия, Дагестан, Дылым, Леваши, Махачкала, Новый Чиркей, Тарумовка, Хив, Куруш, окрестности с Майданское РД, Апшерон, Куба, Хачмас, Гянджа, Ленкорань, Карабах, Кельбаджар, Арагац, Араратская долина, Лори-Памбак, Севан, Бзыбь, Мюсера, Рица, Восточная Грузия, Колхида, Поты, Мтацминда, Тбилиси, Триалетский хребет
167	<i>Oribatula</i> <i>Zygoribatula</i> <i>glabra</i> Michael, 1890	Палеарктика менее часто на севере.	Теберда, окрестности с. Балахани, Майданское и Моксох РД, Ахты, Куруш, Самур, Тлярата, Астара, Кельбаджар, Рица, Верхняя Картли, Делиси, Казбеги
168	<i>Oribatula</i> <i>Zygoribatula</i> <i>spherisensilla</i> Djaparidze, 1985	Кавказ	Домбай, Чегет, Башиль, окрестности с Майданское РД, Ахты, Ботлих, Цумилух, Закаталы, Гирканский заповедник, Дилижан, Бзыбь, Гумрисы, Западная Грузия
169	<i>Hemileius</i> H. <i>eperezinigoae</i> Subías, 2009	Средиземноморье.	Махачкала, окрестности с Майданское РД
170	<i>Hemileius</i> H. <i>humeralis</i> <i>humeralis</i> Pérez-Íñigo jr., 1991	Палеарктика Средиземноморье и восточная Палеарктика: исключая восточную часть	Лагонаки, Теберда, Домбай, Чегет, Гоквари, Самур, окрестности с Майданское РД, Цумилух, Чираг
171	<i>Hemileius</i> <i>Simkinia ovalis</i> Kulijev, 1968.	Средиземноморье.	Брянская коса, окрестности с Майданское РД, Тальш
172	<i>Hemileius</i> <i>Simkinia</i> <i>tianschanicus</i> Krivolutsky, 1971	южная Палеарктика Украина: Крым, и Средняя Азия	окрестности с Майданское РД
173	<i>Hemileius</i> <i>Simkinia</i> <i>turanicus</i> Krivolutsky, 1966	Палеарктика южная юго-восточная Европа и юго-восточная Палеарктика: часто	Ростов, Дагестан, Дербент, Махачкала, Тлярата, Цумилух, окрестности с Майданское РД
174	<i>Liebstadia</i> L.	Голарктика	Теберда, окрестности с. Майданское и Моксох



	<i>humerala</i> Sellnick, 1928	западная Палеарктика: часто; Неарктика и Вьетнам.	РД, Куруш, Терско-Кумская низменность, Прикаспийская низменность, Цумилух, Кельбаджар, Шеки
175	<i>Liebstadia L.</i> <i>longior</i> Berlese, 1908	Голарктика Палеарктика и Канада	окрестности с. Балахани, Майданское и Моксох РД Ростов, Сочи, Закаталы, Шеки, Мюсера, Новый Афон, Ходжала, Рица, Кинтриши, Королистави
176	<i>Liebstadia L.</i> <i>pannonica</i> <i>pannonica</i> Willmann, 1951	Голарктика: Палеарктика часто и США Северная Каролина.	Ростов, Абрау, Домбай, Лагонаки, Дагестан, Новый Чиркей, Гоквари, Гуниб, Леваши, Куруш, Тлярата, окрестности с. Майданское РД, Рица, Батуми, Гомборский хребет, Лагодехи, Сатапли, Тбилиси
177	<i>Liebstadia L.</i> <i>similis similis</i> Michael, 1888	Голарктика Палеарктика и северная Неарктика: часто; Индия Сикким и Новая Зеландия.	Ростов, Абрау, Лагонаки, Домбай, Чегет, Пятигорск, Северная Осетия, Моздок, Гоквари, Гуниб, Куруш, Новый Чиркей, Кизилюрт, Буйнакск, Кумух, Махачкала, Микрах, Самур, Тлярата, Цумилух, Унцукульский р-н РД, Цовкра, Цумада, Цумилух, Чираг, Агдам, Гянджа, Сальяны, Апшерон, Куба, Хачмас, Закаталы, Исмаиллы, Карабах, Гирканский заповедник, Араратская долина, Севан, Салах, Севан, Бакуриани, Боржоми, Восточная Грузия, Тбилиси, Дманиси, Лагодехи, Колхида, Марткоби, Мтацминда, Никорицминда, Поты, Сагурамо, Триалетский хребет, Цихисджвари
178	<i>Perscheloribat</i> <i>es sp.</i>	Кавказ.	Домбай, Чегет, Башиль, Гоквари, Гуниб, окрестности с. Майданское РД
179	<i>Scheloribates</i> <i>laevigatus</i> <i>laevigatus</i> Koch, 1835	Семикосмополит Голарктика: часто; палеотропическая зона.	Ростов, Домбай, Теберда, Хоста, Абрау, Пятигорск, Северная Осетия, Крестовый перевал, Моздок, Лагонаки, Буйнакск, Берикей, Гоквари, Гуниб, Дылым, Куруш, Микрах, Прикаспийская низменность, Терско-Кумская низменность, Тлярата, Цумилух, Унцукульский р-н РД, Агдам, Актафа, Астара, оз. Гек-Гель, Гаджикенд, Гянджа, Кельбаджар, Кюрдамир, Кяляба, Мингечаур, Сальяны, Чирагедзор, Шеки, Апшерон, Куба, Хачмас, Закаталы, Карабах, Ленкорань, Саатлы, Гирканский заповедник, Талыш, Ширван, Арагац, Араратская долина, Лори-Памбак, Севан, Бзыбь, Мюсера Рица, Сакен, Сухум, Ходжала, Алгети, Бакуриани, Батуми, Боржоми, Шираки, Верхняя Картли, Восточная Грузия, Годержи, Кватия, Хино, Черное озеро, Чорохи, Чхутунети, Гомборский хребет, Делиси, Дманиси, Испани, Набада, Казбеги, Колхида, Кулеви, Мальтаква, Лагодехи, Манглиси, Марткоби,

			Мтацминда, Сагурамо, Тбилиси, Триалетский хребет, Цагвери, Цеми, Цкиниори
180	<i>Scheloribates pallidulus pallidulus</i> Koch, 1841	Космополит исключая Антарктику; часто в Голарктике.	Новороссийск, Сочи, Геленджик, Пятигорск, Теберда, Домбай, Ахты, Буйнакск, Махачкала, Гуниб, Куруш, Тлярата, Прикаспийская низменность, Цумилух, окрестности с. Майданское РД, Чираг, Агдам, Гянджа, Сальяны, Гирканский заповедник, Талыш, Салах, Восточная Грузия, Мтацминда, Набада, Триалетский хребет, Тбилиси
181	<i>Protoribates P. capucinus</i> Berlese, 1908	Космополит исключая Антарктику: часто в тропической исключая Эфиопскую область и субтропической зонах.	Ростов, Новороссийск, Сочи, Теберда, Дагестан, Хоста, Пятигорск, Башиль, Северная Осетия, Крестовый перевал, Моздок, Ахты, Дылым, Буйнакск, Новый Чиркей, Кизилюрт, Махачкала, Хив, Гоквари, Гуниб, Межгюль, Прикаспийская низменность, Терско-Кумская низменность, Унцукульский р-н РД, Самур, Чираг, Азербайджан, Агдам, Гянджа, Ленкорань Сальяны, Шеки, Апшерон, Каладуз, Кипчал, Хачмас, Закаталы, Исмаиллы, Гирканский заповедник, Талыш, Армавир, Варденис, Гарни, Бзыбь, Мюсера, Очамчыра, Рица, Сакен, Скурча, Сухум, Батуми, Гомборский хребет, Дидваке, Лагодехи, Парто Цхали, Тбилиси, Хашури, Хино, Цкиниори, Чорохи, Чхутунети
182	<i>Protoribates P. dentatus</i> Berlese, 1883	Голарктика, Восточная область Филиппины и Вьетнам и Меланезия о. Фиджи.	Крайновка, Терско-Кумская низменность, окрестности с. Майданское РД, Гирканский заповедник, Скурча, Батуми, Триалетский хребет, Хашури
183	<i>Protoribates Triaungius</i> sp.	Кавказ	Гуниб, окрестности с. Майданское РД, Сатапли, Батуми
184	<i>Indoribates Haplozetes vindobonensis</i> Willmann, 1935	Палеарктика часто и Йемен.	Ростов, окрестности с. Аракани и Балахани РД, Буйнакск, Махачкала, Берикей, Хебда, Самур, Карашамб, Сакен, Боржом, Триалетский хребет
185	<i>Lauritzenia Incabates tenuifusus</i> Berlese, 1916	Средиземноморье.	Чегет, Башиль, Гуниб, Махачкала, Ньюгди, окрестности с. Майданское РД, Цумилух, Закаталы, Хашури
186	<i>Acrogalumna longipluma longipluma</i> Berlese, 1904	Семикосмополит: Голарктика часто в Европе, Эфиопская область Южная Африка и о. Св.	Северная Осетия, Теберда, Чегет, Самур, окрестности с. Майданское, Аракани и Моксох РД, Цумилух, Апшерон, Закаталы, Исмаиллы, Батуми, Верхняя Картли, Делиси, Манглиси, Цагвери

		Елены, Восточная область Индия и юго-восточный Китай и Новая Зеландия.	
187	<i>Galumna alata</i> Hermann, 1804	Семикосмополит западная Палеарктика: менее часто на севере; США: часто; Сейшельские и Гавайские о-ва, Аргентина и Антарктика: о. Южная Джорджия	Дагестан, Самур, окрестности с. Майданское РД, Верхняя Картли, Тбилиси, Лагодехи
188	<i>Galumna dimorpha</i> Krivolutskaja, 1952	центральная и южная Палеарктика исключая восточную часть	окрестности с. Балахани и Аракани РД, Абрау, оз. Гек-Гель, Кельбаджар, Ленкорань, Чирагедзор, Гирканский заповедник
189	<i>Galumna lanceata</i> Oudemans, 1900	Палеарктика часто и Вьетнам	Теберда, Домбай, Чегет, Северная Осетия, окрестности с. Моксох и Аракани РД, Ахты, Брянская коса, Буйнакск, Гоквари, Гуниб, Махачкала, Самур, Чираг, Карабах, Кура-Араксинская низменность, Рица, Сальяны, Салах, Севан, Кокотаури, Цхиниори
190	<i>Psammogalumna hungarica</i> Sellnick, 1925	южная Палеарктика исключая крайний восток и запад	Дагестан, Избербаш, Махачкала, окрестности с. Майданское РД

Авторы искренне благодарны Зайцеву Андрею Станиславовичу - к.г.н., научному сотруднику лаборатории почв ИПЭЭ им. А.Н.Северцова (Москва) в уточнении видового состава, а также за предоставленную в распоряжении лабораторию и богатейшую подборку литературы по данной группе; Штанчаевой Уме Ярагиевне - к.б.н., профессору Университета Комплутенсе Мадрида (Испания) и Луису Сантосу Субиасу – д.б.н., почетному профессору Университета Комплутенсе Мадрида (Испания), за оказанную огромную консультативную помощь, определение и описание отдельных видов, ценные советы на разных этапах данной работы.

### Литература

1. Абдурахманов Г.М., Давудова Э.З. Материалы к видовому составу панцирных клещей ACARI, ORIBATIDA Ирганайской аридной котловины Внутреннего горного Дагестана. // Юг России: экология, развитие. – Махачкала, 2011. - №3. – С.29 – 37
2. Штанчаева У.Я., Субиас Л. С. Обзор панцирных клещей семейства Suctobelbidae Acariformes, Oribatida Кавказа// Зоол. журн. Т 88 №11 С. 1326 – 1349
3. Штанчаева У.Я., Субиас Л. С. Обзор панцирных клещей семейства Oribatellidae Acariformes, Oribatida Кавказа// Зоол. журн. Т 88 №2 С. 143 – 163
4. Штанчаева У.Я., Субиас Л.С. Каталог панцирных клещей Кавказа. ПИБР ДНЦ РАН, Махачкала 2010

### References

1. Abdurahmanov G.M., Davudova Je.Z. Materialy k vidovomu sostavu pancirnyh kleshhej ACARI, ORIBATIDA Irganajskoj aridnoj kotloviny Vnutrennego gornogo Dagestana. // Jug Rossii: jekologija, razvitie. – Mahachkala, 2011. - №3. – S.29 – 37
2. Shtanchaeva U.Ja., Subias L. S. Obzor pancirnyh kleshhej semejstva Suctobelbidae Acariformes, Oribatida Kavkaza// Zool. zhurn. T 88 №11 S. 1326 – 1349
3. Shtanchaeva U.Ja., Subias L. S. Obzor pancirnyh kleshhej semejstva Oribatellidae Acariformes, Oribatida Kavkaza// Zool. zhurn. T 88 №2 S. 143 – 163
4. Shtanchaeva U.Ja., Subias L.S. Katalog pancirnyh kleshhej Kavkaza. PIBR DNC RAN, Mahachkala 2010