

УДК 519.2

UDC 519:2

01.00.00 Физико-математические науки

Physics and mathematical sciences

**ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ РЕШЕНИЙ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ****THE LIMIT THEORY OF THE SOLUTIONS
OF EXTREMAL STATISTICAL PROBLEMS**

Орлов Александр Иванович
д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор
РИНЦ SPIN-код: 4342-4994

*Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана, Россия, 105005,
Москва, 2-я Бауманская ул., 5, prof-orlov@mail.ru*

Orlov Alexander Ivanovich
Dr.Sci.Econ., Dr.Sci.Tech., Cand.Phys-Math.Sci.,
professor
*Bauman Moscow State Technical University,
Moscow, Russia*

Многие процедуры прикладной математической статистики основаны на решении экстремальных задач. В качестве примеров достаточно назвать методы наименьших квадратов, максимального правдоподобия, минимального контраста, главных компонент. В соответствии с новой парадигмой прикладной математической статистики центральной частью этой научно-практической дисциплины является статистика нечисловых данных (ее называют также статистикой объектов нечисловой природы или нечисловой статистикой), в которой эмпирические и теоретические средние определяются путем решения экстремальных задач. Как показано в настоящей статье, справедливы законы больших чисел, согласно которым эмпирические средние приближаются к теоретическим при росте объема выборки. Большое значение имеют предельные теоремы, описывающие асимптотическое поведение решений экстремальных статистических задач. Например, в методе наименьших квадратов выборочные оценки параметров зависимости приближаются к теоретическим значениям, оценки максимального правдоподобия стремятся к оцениваемым параметрам, и т.д. Вполне естественно стремиться изучить асимптотику решений экстремальных статистических задач в общем случае. Соответствующие результаты могут быть использованы в различных частных случаях. В этом и состоит теоретическая и практическая польза предельных результатов, полученных при наиболее слабых предположениях. Настоящая статья посвящена серии предельных теорем, касающихся асимптотики решений экстремальных статистических задач в наиболее общих постановках. Наряду с результатами теории вероятностей используется аппарат общей топологии. Основные отличия результатов настоящей статьи от многочисленных исследований по близкой тематике таковы: рассматриваются пространства общей природы; поведение решений изучается для экстремальных статистических задач общего вида; удается ослабить обычные требования типа бикомпактности путем введения условий типа

Many procedures of applied mathematical statistics are based on the solution of extreme problems. As examples it is enough to name methods of least squares, maximum likelihood, minimal contrast, main components. In accordance with the new paradigm of applied mathematical statistics, the central part of this scientific and practical discipline is the statistics of non-numerical data (it is also called the statistics of objects of non-numerical nature or non-numeric statistics) in which the empirical and theoretical averages are determined by solving extreme problems. As shown in this paper, the laws of large numbers are valid, according to which empirical averages approach the theoretical ones with increasing sample size. Of great importance are limit theorems describing the asymptotic behavior of solutions of extremal statistical problems. For example, in the method of least squares, selective estimates of the parameters of the dependence approach the theoretical values, the maximum likelihood estimates tend to the estimated parameters, etc. It is quite natural to seek to study the asymptotic behavior of solutions of extremal statistical problems in the general case. The corresponding results can be used in various special cases. This is the theoretical and practical use of the limiting results obtained under the weakest assumptions. The present article is devoted to a series of limit theorems concerning the asymptotics of solutions of extremal statistical problems in the most general formulations. Along with the results of probability theory, the apparatus of general topology is used. The main differences between the results of this article and numerous studies on related topics are: we consider spaces of a general nature; the behavior of solutions is studied for extremal statistical problems of general form; it is possible to weaken ordinary requirements of bicomactness type by introducing conditions of the type of asymptotic uniform divisibility

асимптотической равномерной разбиваемости

Ключевые слова: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА, ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА, НЕЧИСЛОВАЯ СТАТИСТИКА, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, ТЕОРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ, ОБЩАЯ ТОПОЛОГИЯ, БИКОМПАКТНОСТЬ, СХОДИМОСТЬ ПО ВЕРОЯТНОСТИ, СХОДИМОСТЬ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 1

Keywords: MATHEMATICAL STATISTICS, APPLIED STATISTICS, NON-NUMERICAL STATISTICS, EXTREMAL STATISTICAL PROBLEMS, OPTIMIZATION THEORY, LIMIT THEOREMS, GENERAL TOPOLOGY, BICOMPACTNESS, CONVERGENCE IN PROBABILITY, CONVERGENCE WITH PROBABILITY 1

Doi: 10.21515/1990-4665-133-045

1. Введение

Многие статистические методы основаны на решении экстремальных задач. В качестве примеров достаточно назвать методы наименьших квадратов, максимального правдоподобия, минимального контраста, главных компонент. В соответствии с новой парадигмой прикладной математической статистики центральной частью этой научно-практической дисциплины является статистика нечисловых данных (ее называют также статистикой объектов нечисловой природы или нечисловой статистикой), в которой эмпирические и теоретические средние определяются путем решения экстремальных задач.

Справедливы законы больших чисел, согласно которым эмпирические средние приближаются к теоретическим при росте объема выборки. Большое значение имеют предельные теоремы, описывающие асимптотическое поведение решений экстремальных статистических задач. Например, в методе наименьших квадратов выборочные оценки параметров зависимости приближаются к теоретическим значениям, оценки максимального правдоподобия стремятся к оцениваемым параметрам, и т.д.

Вполне естественно стремиться изучить асимптотику решений экстремальных статистических задач в общем случае. Соответствующие результаты могут быть использованы в различных частных случаях. В

этом и состоит теоретическая и практическая польза предельных результатов, полученных при наиболее слабых предположениях.

Настоящая статья посвящена серии предельных теорем, касающихся асимптотики решений экстремальных статистических задач в наиболее общих постановках.

2. Случай конечного пространства

Исходим из аксиоматики А.Н. Колмогорова теории вероятностей [1, 2]. Пусть $\{\Omega, F, P\}$ - вероятностное пространство, где Ω - пространство элементарных событий, F - σ -алгебра случайных событий, P - вероятностная мера на этой σ -алгебре. Пусть Z - пространство параметров, $f_n : Z \times \Omega \rightarrow R^1$ - последовательность случайных функций.

Пусть существует предельная функция $f : Z \rightarrow R^1$ такая, что

$$f_n(x, \omega) \rightarrow f(x) \quad (1)$$

при $n \rightarrow \infty$ и всех $x \in Z$. В соотношении (1) будем рассматривать два вида сходимости - по вероятности и с вероятностью 1.

Положим

$$E(f_n) = \underset{x \in Z}{\text{Arg min}} f_n(x, \omega), \quad E(f) = \underset{x \in Z}{\text{Arg min}} f(x).$$

Тогда случайное множество $E(f_n)$ и множество $E(f)$ непусты из-за конечности множества Z .

Будем изучать сходимость $E(f_n)$ к $E(f)$ при $n \rightarrow \infty$ и, в частности, получим законы больших чисел [3, 4]. Такие постановки возникают и в оптимизационном подходе к задачам прикладной статистики [5].

Теорема 1. Пусть справедливо соотношение (1) (сходимость по вероятности). Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(E(f_n) \subseteq E(f)) = 1. \quad (2)$$

Доказательство. Положим

$$a = \min\{f(x), x \in Z\}, \quad b = \min\{f(x), x \in Z \setminus E(f)\},$$

$$\varepsilon = \frac{1}{3}(b - a), \quad B_n = \{\omega : |f_n(x, \omega) - f(x)| \leq \varepsilon, \forall x \in Z\}.$$

Из конечности Z следует, что $\varepsilon > 0$. Если $\omega \in B_n$, то $E(f_n) \subseteq E(f)$.

Имеем

$$P(B_n) \geq 1 - \sum_{x \in Z} P\{|f_n(x, \omega) - f(x)| > \varepsilon\}. \quad (3)$$

Из (1) и (3) следует, что $P(B_n) \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$, а потому справедливо (2). Теорема 1 доказана.

В качестве примеров рассмотрим законы больших чисел в пространствах общей (другими словами, произвольной) природы.

Пусть Z - пространство общей природы, X - случайный элемент со значениями в Z [2], функция $\rho: Z^2 \rightarrow [0, +\infty)$ интерпретируется как показатель различия (мера близости, аналог расстояния, метрики) между элементами Z , т.е. $\rho(x, x) = 0$ и $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ для любых x, y из Z .

Математическим ожиданием (или теоретическим средним) случайного элемента X относительно показателя различия ρ называется

$$E(X, \rho) = \underset{x \in Z}{\text{Arg min}} M\rho(X, x). \quad (4)$$

Запись (4) предполагает, что $\rho(X, x)$ - действительная случайная величина (т.е. принимающая числовые значения) с математическим ожиданием $M\rho(X, x)$. В дальнейшем это условие будем считать выполненным. Ясно, что теоретическое среднее (4) не всегда существует - минимум может не достигаться или же $M\rho(X, x) = +\infty$ для всех $x \in Z$. Теоретическое среднее (4), вообще говоря, - подмножество, а не элемент Z . Ясно также, что теоретическое среднее зависит не только от случайного элемента X , но и от показателя различия ρ .

Эмпирическим средним выборки X_1, X_2, \dots, X_n элементов Z относительно показателя различия ρ называется

$$E_n(\rho) = \underset{x \in Z}{\text{Arg min}} \sum_{1 \leq i \leq n} \rho(X_i, x). \quad (5)$$

Все замечания, высказанные выше по поводу теоретического среднего, относятся и к эмпирическому среднему, поскольку (4) переходит в (5), если математическое ожидание берется по эмпирическому распределению, приписывающему каждому элементу выборки X_i меру n^{-1} .

Если Z состоит из конечного числа элементов, то в (4) и (5) минимум берется из конечного числа слагаемых, а потому существование эмпирических и теоретических средних величин очевидно. В большинстве прикладных задач Z конечно.

Перейдем к формулировкам законов больших чисел (сходимость по вероятности). Пусть сначала теоретическое среднее $E(X, \rho)$ состоит ровно из одного элемента.

Теорема 2 (закон больших чисел). Пусть X, X_1, X_2, \dots, X_n одинаково распределены и попарно независимы. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{E_n(\rho) \neq E(X, \rho)\} = 0.$$

Если теоретическое среднее $E(X, \rho)$ состоит более чем из одного элемента, то теорема 2 остается справедливой при следующей модификации.

Теорема 3 (закон больших чисел). Пусть X, X_1, X_2, \dots, X_n распределены и попарно независимы. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{E_n(\rho) \subseteq E(X, \rho)\} = 1.$$

Доказательство теорем 2 и 3. Рассмотрение законов больших чисел в конечном пространстве сводится к постановкам начала настоящего раздела, если положить

$$f_n(x, \omega) = \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i \leq n} \rho(X_i, x), \quad f(x) = M\rho(X_1, x).$$

Дисперсия $\rho(X_i, x)$ конечна в силу конечности Z , а потому (1) справедливо по теореме Чебышёва [6, с.203]. Ссылка на теорему 1 завершает доказательство теоремы 3.

Если $E(f)$ содержит ровно один элемент, то включение $E(f_n) \subseteq E(f)$ эквивалентно равенству $E(f_n) = E(f)$ в силу непустоты $E(f_n)$. Это замечание объясняет формулировку теоремы 2, справедливость которой следует из сказанного выше.

Перейдем к рассмотрению сходимости с вероятностью 1.

Теорема 4. Пусть справедливо соотношение (1) (сходимость с вероятностью 1). Тогда с вероятностью 1 существует случайный номер $N = N(\omega)$ такой, что $E(f_n) \subseteq E(f)$ при всех $n > N$.

Доказательство. Пусть ε - то же, что в теореме 1. С вероятностью 1 найдутся номера (натуральные числа) $N(\omega, x)$ такие, что

$$|f_n(x, \omega) - f(x)| < \varepsilon \quad (6)$$

при $n > N(\omega, x)$. Положим $N = \max\{N(\omega, x), x \in Z\}$. Если $n > N$, то неравенство (6) выполнено одновременно для всех $x \in Z$, следовательно, $\omega \in B_n$, а потому $E(f_n) \subseteq E(f)$, что и требовалось доказать.

Рассмотрим применения к законам больших чисел (сходимость с вероятностью 1). Пусть сначала теоретическое среднее $E(X, \rho)$ состоит ровно из одного элемента.

Теорема 5 (усиленный закон больших чисел, частный случай). Пусть X, X_1, X_2, \dots, X_n независимы и одинаково распределены. Тогда вероятностью 1 существует случайный номер $N = N(\omega)$ такой, что $E_n(\rho) = E(X, \rho)$ при всех $n > N$.

Если теоретическое среднее $E(X, \rho)$ состоит, возможно, более чем из одного элемента, то теорема 5 остается справедливой при следующей модификации.

Теорема 6 (усиленный закон больших чисел, общий случай). Пусть X, X_1, X_2, \dots, X_n независимы и одинаково распределены. Тогда вероятностью 1 существует случайный номер $N = N(\omega)$ такой, что $E_n(\rho) \subseteq E(X, \rho)$ при всех $n > N$.

Доказательство теорем 5 и 6. Усиленный закон больших чисел для случайных величин $\rho(X_i, x)$, $i=1,2,\dots$, вытекает из теоремы А.Н. Колмогорова [6, с.221], поскольку они одинаково распределены и взаимно независимы. Значит, соотношение (1) справедливо. Для завершения доказательства достаточно сослаться на теорему 4. Если $E(f)$ содержит ровно один элемент, то включение $E(f_n) \subseteq E(f)$ эквивалентно равенству $E(f_n) = E(f)$ в силу непустоты $E(f_n)$. Это замечание поясняет формулировку теоремы 5.

Результаты настоящего параграфа опираются на подход, развитый в [7, п.4.4].

3. Пространства общей природы: предварительные определения

В п.1 выше существенно использовалась конечность пространства Z . Для переноса результатов на пространства общей природы понадобится ряд определений.

Пусть дана функция $f : Z \rightarrow R^1$. Для произвольного $\varepsilon > 0$ положим

$$K_\varepsilon(f) = \{x : f(x) < \inf\{f(y), y \in Z\} + \varepsilon, x \in Z\}$$

и назовем это множество ε -пяткой функции f на множестве Z . Ясно, что $K_\varepsilon(f) \neq \emptyset$ тогда и только тогда, когда $\inf\{f(y), y \in Z\} > -\infty$. Если $f = f(x, \omega)$ - случайная функция, то ε -пятка $K_\varepsilon(f)$ - случайное множество.

Разбиением $R(Z)$ пространства Z называется конечная совокупность подмножеств $T = T(Z) = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_k\}$, называемых областями, или элементами разбиения, такая, что

$$Z_1 \cap Z_2 \cap \dots \cap Z_k = Z, \quad Z_i \cap Z_j = \emptyset, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, k.$$

Пусть $f: Z \rightarrow R^1$ - действительная функция на Z . Колебанием f на подмножестве $Y \subseteq X$ называется

$$\delta(f, Y) = \sup\{|f(x) - f(x')|, x \in Y, x' \in Y\}.$$

Колебанием f на разбиении $T = T(Z) = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_k\}$ называется

$$\delta(f, T) = \max\{\delta(f, Z_i), i = 1, 2, \dots, k\}.$$

Функция f называется равномерно разбиваемой, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется разбиение $T = T(\varepsilon)$ такое, что $\delta(f, T) < \varepsilon$.

Случайная функция $f(x, \omega)$, определенная на $Z \times \Omega$, где Ω - пространство элементарных событий, называется равномерно разбиваемой, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется разбиение $T = T(\varepsilon)$ множества Z такое, что $P\{\delta(f, T) > \varepsilon\} < \varepsilon$.

Последовательность случайных функций $f_n(x, \omega)$, $n = 1, 2, \dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, называется асимптотически равномерно разбиваемой (АРР-последовательностью), если при любом $\varepsilon > 0$ можно указать такое разбиение $T = T(\varepsilon)$ множества Z , что

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} P\{\delta(f_n, T) > \varepsilon\} < \varepsilon$$

(здесь через $\lim \sup$ обозначен верхний предел).

Последовательность случайных функций $g_n(x, \omega)$, $n = 1, 2, \dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, называется координатно асимптотически разбиваемой (КАРР-последовательностью), если для любого $\varepsilon > 0$ можно указать такое разбиение $T = T(\varepsilon)$ множества Z , что

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \delta(g_n, T(\varepsilon)) < \varepsilon$$

при всех $\omega \in \Omega$.

Замечание 1. Равномерно разбиваемые функции не обязательно являются непрерывными.

Замечание 2. В дальнейшем без специальных оговорок считаем, что $\delta(f_n, Z_i)$ - случайные величины. Достаточные условия для этого могут быть сформулированы, например, с помощью понятия сепарабельности, как мы делали в [8], или соображений, связанных с измеримым выбором [9, добавление 1].

Замечание 3. Материал пп. 3-5 настоящей статьи опирается на подход, предложенный в [10].

4. Равномерная сходимость и сходимость ε -пяток при условии асимптотической равномерной разбиваемости

Теорема 7. Пусть $f_n(x, \omega)$, $n = 1, 2, \dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, - APP-последовательность. Пусть при всех $x \in Z$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, \omega) = f(x) \quad (7)$$

по вероятности. Тогда последовательность f_n равномерно сходится к f , т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \{ |f_n(x, \omega) - f(x)|, x \in Z \} = 0 \quad (8)$$

по вероятности. Обратно, пусть справедливо (8), функция f является равномерно разбиваемой. Тогда f_n является APP-последовательностью.

Доказательство. В силу определения APP-последовательности при произвольном $\varepsilon > 0$ найдется разбиение T и натуральное число n_0 такие, что

$$P\{\delta(f_n, T) \leq \varepsilon\} > 1 - \varepsilon \quad (9)$$

при $n > n_0$. Докажем, что

$$\delta(f, T) \leq \varepsilon. \quad (10)$$

Предположим, что это не так, т.е. проведем доказательство от противного. Тогда можно указать точки x' и x'' , лежащие в одной области разбиения T , но такие, что

$$|f(x') - f(x'')| > \varepsilon. \quad (11)$$

Из (7) и (11) следует, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|f_n(x', \omega) - f_n(x'', \omega)| > \varepsilon\} = 1. \quad (12)$$

Поскольку

$$\delta(f_n, T) \geq |f_n(x', \omega) - f_n(x'', \omega)|,$$

то (12) противоречит (9). Итак, (10) доказано. Из (10) следует, в частности, что

$$\inf\{f(x), x \in Z\} > -\infty.$$

Выберем по точке в каждой из областей разбиения T , т.е. рассмотрим $x_i \in Z_i, i = 1, 2, \dots, k$. Поскольку

$$|f_n(x, \omega) - f(x)| \leq |f_n(x, \omega) - f_n(x', \omega)| + |f_n(x', \omega) - f(x')| + |f(x') - f(x)|, \quad (13)$$

где x' - то из x_i , что лежит с x в одной области разбиения T , то

$$\begin{aligned} \sup\{|f_n(x, \omega) - f(x)|, x \in Z\} &\leq \delta(f_n, T) + \\ &+ \max\{|f(x_i, \omega) - f(x_i)|, i = 1, 2, \dots, k\} + \delta(f, T). \end{aligned} \quad (14)$$

В силу (9) и (10) с вероятностью не менее $1 - \varepsilon$ при $n > n_0$

$$\sup\{|f_n(x, \omega) - f(x)|, x \in Z\} \leq 2\varepsilon + \max\{|f(x_i, \omega) - f(x_i)|, i = 1, 2, \dots, k\}. \quad (15)$$

С помощью (7) заключаем, что при достаточно больших n

$$P\{\sup\{|f_n(x, \omega) - f(x)|, x \in Z\} \leq 3\varepsilon\} \geq 1 - 2\varepsilon, \quad (16)$$

откуда и следует (8).

Перейдем к доказательству обратного утверждения теоремы. Для любых $x \in Z, y \in Z$ имеем

$$f_n(x, \omega) - f_n(y, \omega) = \{f_n(x, \omega) - f(x)\} + \{f(x) - f(y)\} + \{f(y) - f_n(y, \omega)\}. \quad (17)$$

Поскольку f равномерно разбиваема, то по $\varepsilon > 0$ можно указать разбиение $T = T(\varepsilon)$ такое, что $\delta(f, T) < \varepsilon$. Это T будет использовано для доказательства того, что f_n - APP-последовательность. В силу (8) можно указать n_0 такое, что при $n > n_0$ первая и третья скобки в (17) не

превосходят ε (по абсолютной величине) с вероятностью $1-\varepsilon$ каждая.

Тогда

$$P\{\delta(f_n, T) > 3\varepsilon\} < 2\varepsilon, \quad (18)$$

откуда и следует требуемое.

Следствие. Пусть f - равномерно разбиваемая функция. Тогда для того, чтобы из поточечной сходимости (7) последовательности функций f_n к f вытекала равномерная сходимость (8), необходимо и достаточно, чтобы последовательность f_n была асимптотически равномерно разбиваемой.

Теорема 8. Пусть $f_n(x, \omega)$, $n=1,2,\dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, - APP-последовательность. Пусть выполнено (7), т.е. при всех $x \in Z$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, \omega) = f(x)$$

по вероятности. Тогда при любом $\delta > 0$ и любом $C > 1$ вероятность непустоты $K_\delta(f_n)$ стремится к 1 и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\omega: K_\delta(f_n) \subseteq K_{C\delta}(f)\} = 1, \quad (19)$$

т.е. δ -пятка f_n асимптотически входит в $C\delta$ -пятку f .

Доказательство. Пусть Ω_n - совокупность всех тех ω , при которых $\inf\{f_n(x, \omega), x \in Z\} = -\infty$. С помощью соотношения (9) заключаем, что при любом фиксированном $\varepsilon > 0$ и достаточно больших n справедлива оценка $P(\Omega_n) < \varepsilon$, т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\Omega_n) = 0.$$

Фиксируем $\delta > 0$. Рассмотрим $\varepsilon > 0$ и разбиение $T(\varepsilon)$, о котором идет речь в определении APP-последовательности. Тогда при достаточно большом n верно неравенство (9). Рассмотрим по точке x_i в каждой из областей X_i разбиения $T(\varepsilon)$. Пусть K - объединение всех областей разбиения $T = T(\varepsilon)$, полностью лежащих в $K_{C\delta}(f)$. Тогда в силу (9) при достаточно большом n

$$\inf\{f_n(x, \omega), x \in Z \setminus K\} \geq \min\{f_n(x_i, \omega), X_i \subseteq Z \setminus K\} - \varepsilon \quad (20)$$

с вероятностью не менее $1 - \varepsilon$. Из (7), (10) и определения K следует, что с вероятностью не менее $1 - \varepsilon$ при достаточно большом n

$$\begin{aligned} \min\{f_n(x_i, \omega), x_i \in Z \setminus K\} &\geq \min\{f(x_i), x_i \in Z \setminus K\} - \varepsilon \geq \\ &\geq \inf\{f(x), x \in Z\} + C\delta - 2\varepsilon. \end{aligned} \quad (21)$$

Следовательно, с вероятностью не менее $1 - 2\varepsilon$ при достаточно большом n

$$\inf\{f_n(x, \omega), x \in Z \setminus K\} \geq C\delta - 3\varepsilon + \inf\{f(x), x \in Z\}.$$

Рассмотрим теперь элемент $x_0 \in Z$ такой, что

$$f(x_0) < \inf\{f(y), y \in Z\} + \varepsilon.$$

Тогда при достаточно большом n с вероятностью не менее $1 - \varepsilon$

$$f_n(x_0, \omega) \leq \inf\{f(y), y \in Z\} + 2\varepsilon.$$

Следовательно, для всех $x \in K_\delta(f_n)$

$$f_n(x, \omega) \leq \inf\{f(y), y \in Z\} + 2\varepsilon + \delta.$$

Если $C\delta - 3\varepsilon > 2\varepsilon + \delta$, т.е. $(C-1)\delta > 5\varepsilon$, то с вероятностью не менее $1 - 3\varepsilon$

$$K_\delta(f_n) \subseteq K \subseteq K_{C\delta}(f)$$

при достаточно больших n ; теорема 8 доказана.

Пример 1. Пусть в детерминированном случае $Z = [0, 2]$ и

$$f_n(x) = \begin{cases} 0; & x = \frac{1}{n}, \\ 1; & 0 \leq x \leq 1, \quad x \neq \frac{1}{n}, \\ 0,5; & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

Тогда при любом $x \in [0, 2]$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x),$$

где

$$f(x) = \begin{cases} 1; & 0 \leq x \leq 1; \\ 0,5; & 1 < x \leq 2; \end{cases}$$

однако

$$\sup\{|f_n(x) - f(x)|, x \in Z\} = 1$$

при всех n . При $0 < \varepsilon < 0,5$

$$K_\varepsilon(f) = (1,2], K_\varepsilon(f_n) = \{1/n\}.$$

Пример 2. Пусть $Z = [-1, 0) \cup (0, 1]$,

$$f_n(x, \omega) = \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i \leq n} (\xi_i - x)^2, \quad \xi_i = \xi_i(\omega), \quad i = 1, 2, \dots, n, \dots,$$

где ξ_i - независимые равномерно распределенные на $[-1, 1] \setminus \{0\}$ случайные величины. Имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, \omega) = M(\xi - x)^2 = x^2 + 1/3.$$

Справедлива теорема 8, хотя $\inf\{x^2 + 1/3, x \in Z\}$ не достигается, так как точка $x = 0$ исключена из Z .

Эти примеры демонстрируют специфику рассматриваемых соотношений. Ясно вместе с тем, что соотношение (19) может иметь место и при отсутствии асимптотической равномерной разбиваемости.

Для получения аналогов теорем 1 и 4 в случае сходимости с вероятностью 1 необходимо следующее определение.

Определение 1. Последовательность функций $f_n(x, \omega), n = 1, 2, \dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, называется асимптотически равномерно разбиваемой с вероятностью 1 (ВАРР-последовательностью), если при любом $\varepsilon > 0$ можно указать разбиение $T(\varepsilon)$ пространства Z такое, что

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \delta(f_n, T(\varepsilon)) < \varepsilon$$

с вероятностью 1.

Теорема 9. Пусть $f_n(x, \omega), n = 1, 2, \dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, - ВАРР-последовательность. Пусть при всех $x \in Z$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, \omega) = f(x) \tag{22}$$

с вероятностью 1. Тогда последовательность f_n равномерно сходится к f , т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\sup\{|f_n(x, \omega) - f(x)|, x \in Z\}] = 0 \tag{23}$$

с вероятностью 1.

Обратно, пусть справедливо соотношение (23), функция f является равномерно разбиваемой. Тогда f_n - ВАРР-последовательность.

Следствие. Пусть f - равномерно разбиваемая функция. Тогда для того, чтобы из поточечной сходимости (22) последовательности функций f_n к f вытекала равномерная сходимость (23), необходимое и достаточное условие таково: последовательность f_n асимптотически равномерно разбиваема с вероятностью 1.

Теорема 10. Пусть $f_n(x, \omega)$, $n=1,2,\dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, - ВАРР-последовательность и справедливо (22). Тогда при любом $\delta > 0$ и любом $C > 1$ существует с вероятностью 1 случайный номер $N = N(\omega)$ такой, что $K_\delta(f_n) \neq \emptyset$ и $K_\delta(f_n) \subseteq K_{C\delta}(f)$ при всех $n > N$.

Доказательства теорем 9 и 10 получаются из доказательств теорем 1 и 4 путем незначительных изменений, связанных с заменой сходимости по вероятности на сходимость с вероятностью 1 на всех этапах рассуждений, а потому здесь не приводятся.

5. Экстремумы аддитивных статистик

Пусть $g_1(x, \omega), g_2(x, \omega), \dots, g_n(x, \omega), \dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, - независимые случайные функции. Аддитивной статистикой называется

$$f_n(x, \omega) = \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i \leq n} g_i(x, \omega). \quad (24)$$

Предположим, что все $g_i(x, \omega)$ имеют при данном x математические ожидания $Mg_i(x, \omega)$ и равномерно ограниченные дисперсии. Тогда в силу теоремы Чебышёва [6, с.203]

$$f_n(x, \omega) - \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i \leq n} Mg_i(x, \omega) \rightarrow 0 \quad (25)$$

по вероятности при $n \rightarrow \infty$.

Предположим, что при всех x существует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i \leq n} M g_i(x, \omega) = f(x). \quad (26)$$

В соответствии с результатами предыдущего раздела 4 настоящей работы представляет интерес выяснение условий, при которых введенные в (24) функции $f_n(x, \omega)$, $n = 1, 2, \dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, образуют АРР-последовательность.

Заметим, что

$$|f_n(x, \omega) - f_n(x', \omega)| \leq \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i \leq n} |g_i(x, \omega) - g_i(x', \omega)|, \quad (27)$$

а потому

$$\delta(f_n, T) \leq \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i \leq n} \delta(g_i, T). \quad (28)$$

Теорема 11. Пусть выполнено соотношение (26), для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение $T(\varepsilon)$ такое, что математическое ожидание $M\delta(g_n, T(\varepsilon))$ существует при всех n и

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} M\delta(g_n, T(\varepsilon)) < \varepsilon, \quad (29)$$

причем дисперсия $D\delta(g_n, T(\varepsilon))$ существует при всех n и

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} D\delta(g_n, T(\varepsilon)) < \infty. \quad (30)$$

Тогда введенные в (24) функции $f_n(x, \omega)$, $n = 1, 2, \dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, образуют АРР-последовательность.

Доказательство. Возьмем $\varepsilon > 0$. Рассмотрим $T = T(\varepsilon)$. В силу неравенства Чебышёва, соотношений (29) и (30) имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i \leq n} \delta(g_i, T) < 2\varepsilon \right\} = 1. \quad (31)$$

Из (28) и (31) следует, что $f_n(x, \omega)$, $n = 1, 2, \dots, x \in Z, \omega \in \Omega$, является АРР-последовательностью.

Теорема 12. Пусть $\{g_n\}$ - ВАРР последовательность, существует C такое, что $|g_n| < C$ при всех n с вероятностью 1. Тогда $\{f_n\}$ - ВАРР-последовательность.

Доказательство. Из (28) и определения 1 раздела 4 следует, что в качестве разбиений $T(\varepsilon)$ для f_n можно использовать таковые для g_n , существующие в силу определения 1.

От аддитивных статистик общего вида (24) перейдем к важному частному случаю. Пусть $\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots, \xi_n(\omega), \dots$ - независимые случайные величины со значениями в некотором множестве Y , функция $h: Z \times Y \rightarrow R^1$ и

$$g_n(x, \omega) = h(x, \xi_n(\omega)), \quad n = 1, 2, \dots \quad (32)$$

Понадобится используемое в общей топологии понятие бикompакта (бикompактного хаусдорфова пространства) [11].

Теорема 13. Пусть Z и Y - бикompакты, h - непрерывная функция (в топологии произведения). Тогда последовательность функций $\{g_n, n = 1, 2, \dots\}$ из (32) - КАРР-последовательность.

Доказательство. В [3, 4] установлено существование открытого подпокрытия W_1, W_2, \dots, W_m множества Z (в терминах [11]) такого, что если x и x' принадлежат одному и тому же элементу подпокрытия W_j при каком-либо j , то

$$\sup\{|h(x, y) - h(x', y)|, y \in Y\} < \varepsilon \quad (33)$$

(доказательство в [3, 4] ведется в случае $Z = Y$, но легко видеть: при замене Z^2 на $Z \times Y$ рассуждения проходят без изменений).

Систему множеств W_1, W_2, \dots, W_m превратим в разбиение $T(\varepsilon)$, отнеся стандартным образом общие точки к множеству с минимальным номером. Это разбиение и будет искомым. Действительно, в силу (33) при любом ξ_n , а потому и при любом ω , имеем $\delta(g_n, T(\varepsilon)) < \varepsilon$, а потому $\{g_n\}$ удовлетворяет определению КАРР-последовательности (см. раздел 3). Теорема 13 доказана.

Следствие. Пусть Z и Y - бикомпакты, $h: Z \times Y \rightarrow R^1$ - непрерывная функция, $\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots, \xi_n(\omega), \dots$ - независимые одинаково распределенные случайные величины со значениями в Y . Тогда при любых $\delta > 0$ и $C > 1$ имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\omega: K_\delta(f_n) \subseteq K_{C\delta}(f)\} = 1, \quad (34)$$

где

$$f_n(x, \omega) = \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i \leq n} h(x, \xi_i), \quad f(x) = Mh(x, \xi_i). \quad (35)$$

Следствие вытекает из теорем 8, 11 и 13. Заметим, что в силу непрерывности h и того, что минимум непрерывной функции на бикомпакте достигается,

$$K_0(f_n) = \text{Arg min}_{x \in Z} \sum_{1 \leq i \leq n} h(x, \xi_i) \neq \emptyset.$$

В [3, 4] показано, что и $K_0(f) \neq \emptyset$. Следовательно, справедлива следующая теорема, анонсированная в [12] (резюме доклада на Семинаре по математической статистике, посвященном памяти член-корр. АН СССР Л.Н. Большева, 8-12 октября 1979 г., Математический институт им. В.А. Стеклова АН СССР).

Теорема 14. В условиях следствия $K_0(f_n) \neq \emptyset$ и $K_0(f) \neq \emptyset$, при любом $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{K_0(f_n) \subseteq K_\varepsilon(f)\} = 1. \quad (36)$$

Заключение теоремы 14 можно интерпретировать как состоятельность оценок минимального контраста, обобщающих оценки максимального правдоподобия [5]. При $Z = Y$ теорема 14 переходит в закон больших чисел (ср. результаты, приведенные в статьях [3, 4]).

Пример 3. Рассмотрим задачу аппроксимации (другими словами, параметрической регрессии). Пусть $\xi_i = (\xi_i^1, \xi_i^2)$, а $h(x, \xi_i) = H(q(x, \xi_i^1), \xi_i^2)$. Таким образом, предполагается, что мы ищем наилучшее приближение ξ_i^2

с помощью параметрического семейства функций $q(x, \xi_i^1)$, где x - параметр; при этом H - показатель различия (другими мера близости, расстояние, метрика или псевдометрика) в пространстве, в котором лежит ξ_i^2 . Из непрерывности q и H вытекает непрерывность h . Соотношения (34) - (36) интерпретируются как состоятельность оценки параметра аппроксимации x . В случае параметрической регрессии эти соотношения показывают также, к какому пределу сходятся оценки при неадекватности модели.

Перейдем к сходимости с вероятностью 1.

Теорема 15. Пусть $g_n(x, \omega)$, $n=1,2,\dots$, одинаково распределены, для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение $T(\varepsilon)$ такое, что $M\delta(g_n, T(\varepsilon)) < \varepsilon$. Тогда $\{f_n\}$ - ВАРР-последовательность.

Доказательство вытекает из теоремы А.Н. Колмогорова [6, с.221] об усиленном законе больших чисел, согласно которой

$$\frac{1}{n} \sum_{1 \leq i \leq n} g_i(x, \omega) \rightarrow M g_1(x, \omega)$$

с вероятностью 1.

Аналогом следствия к теореме 13 и теореме 14 является следующее утверждение.

Теорема 16. Пусть Z и Y - бикомпакты, $h: Z \times Y \rightarrow R^1$ - непрерывная функция, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ - независимые одинаково распределенные случайные элементы со значениями в Y . Тогда $K_0(f) \neq \emptyset$ и $K_0(f_n) \neq \emptyset$ с вероятностью 1. Для любого $\varepsilon > 0$ существует с вероятностью 1 случайный номер $N = N(\varepsilon, \omega)$ такой, что $K_0(f_n) \subseteq K_\varepsilon(f)$ при всех $n > N$.

Доказательство вытекает из теорем 10, 12 и 13.

С помощью приведенных выше результатов можно получать и другие варианты предельных теорем. Примером является следующее утверждение.

Теорема 17. Пусть $g_n(x, \omega)$, $n=1, 2, \dots$, - независимые одинаково распределенные случайные элементы, $Mg_n(x, \omega)$ существует, для любого $\varepsilon > 0$ найдется разбиение $T(\varepsilon)$ такое, что $M\delta(g_n, T(\varepsilon)) < \varepsilon$. Тогда при любом $\delta > 0$ и любом $C > 1$ существует с вероятностью 1 случайный номер $N = N(\omega)$ такой, что $K_\delta(f_n) \neq \emptyset$ и $K_\delta(f_n) \subseteq K_{C\delta}(f)$ при всех $n > N$.

Доказательство. По теореме 15 $\{f_n\}$ - ВАРР-последовательность. По теореме А.Н. Колмогорова об усиленном законе больших чисел справедливо соотношение (22). Ссылка на теорему 10 завершает доказательство.

Обсудим законы больших чисел. Условия существования эмпирического среднего $E_n(\rho)$ и математического ожидания $E(X, \rho)$ рассмотрены в [3, 4]. Ряд утверждений о законах больших чисел можно получить на основе результатов настоящего раздела при $Z = Y$.

Теорема 18. Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ - независимые одинаково распределенные случайные элементы со значениями в бикомпакте Z , а функция $\rho: Z^2 \rightarrow R^1$ непрерывна. Тогда при любом $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{E_n(\rho) \subseteq K_\varepsilon(f)\} = 1,$$

где $f(x) = M\rho(X_1, x)$; существует с вероятностью 1 случайный номер $N = N(\omega)$ такой, что $E_n(\rho) \subseteq K_\varepsilon(f)$ при всех $n > N$.

Для доказательства достаточно сослаться на теоремы 14 и 17. Теорема 18 представляет собой одну из возможных точных формулировок законов больших чисел [3, 4].

Представляет интерес отказ от предположения бикомпактности Z . Можно потребовать, чтобы $\{\rho(X_n, x), n=1, 2, \dots\}$ была АРР-, ВАРР- или КАРР-последовательностью и применить полученные в настоящей статье результаты. Однако из этого требования вытекает, что функция ρ ограничена на Z^2 . Можно воспользоваться комплексом условий, при

которых в [3, 4] доказано существование теоретического и эмпирического средних. Соответствующие теоремы о законах средних чисел получены в [3, 4].

6. Заключительные замечания

Основные отличия результатов настоящей статьи от многочисленных исследований по близкой тематике таковы: рассматриваются пространства общей природы; поведение решений изучается для экстремальных статистических задач общего вида; удается ослабить обычные требования типа бикompактности путем введения условий типа асимптотической равномерной разбиваемости.

Согласно новой парадигме прикладной статистики [13] задачи оптимизации занимают центральное место в математических методах статистики, в то время как в старой парадигме середины XX в. такое место занимали суммы случайных величин и функции от сумм. Необходимо отметить, что основанные на решении экстремальных задач критерии Колмогорова и Смирнова иногда используются неправильно [14]. Связано это с тем очевидным фактом, что объем накопленной к настоящему времени научной информации на много порядков превышает возможности ее освоения отдельным исследователем [15].

Экстремальные статистические задачи занимают важное место в различных прикладных областях, в которых используются вероятностно-статистические модели и методы. Можно указать задачи анализа, оценки и управления рисками [16], современные подходы к управлению инновациями и инвестициями [17], методы разработки информационных систем управления предприятиями [18]. Много экстремальных статистических задач рассмотрено в монографиях [19 - 22].

Литература

1. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. 2-е изд. — М.: Наука, 1974. — 120 с.
2. Вероятность и математическая статистика: Энциклопедия / Гл. ред. Ю.В. Прохоров. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. – 911 с.
3. Орлов А.И. О средних величинах // Управление большими системами. Выпуск 46. М.: ИПУ РАН, 2013. С.88-117.
4. Орлов А.И. Средние величины и законы больших чисел в пространствах произвольной природы // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 89. С. 175-200.
5. Орлов А.И. Прикладная статистика. - М.: Экзамен, 2006. - 671 с.
6. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. - М.: Наука, 1969. - 400 с.
7. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. - 296 с.
8. Орлов А.И. Асимптотическое поведение статистик интегрального типа // Доклады АН СССР. - 1974. - Т.219. - №4. - С.808-811.
9. Аркин В.И., Евстигнеев И.В. Вероятностные модели управления и экономической динамики. - М.: Наука, 1979. 176 с.
10. Орлов А.И. Асимптотика решений экстремальных статистических задач // Анализ нечисловых данных в системных исследованиях / Сборник трудов ВНИИ системных исследований. - 1982. - Вып.10. - С. 4-12.
11. Келли Дж.Л. Общая топология. - М.: Наука 1968. - 384 с.
12. Орлов А.И. Статистика объектов нечисловой природы // Теория вероятностей и ее применения. 1980. Т. XXV. № 3. С.655-656.
13. Орлов А.И. Новая парадигма прикладной статистики // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2012. №1, часть I. Том 78. С. 87-93.
14. Орлов А.И. Распространенная ошибка при использовании критериев Колмогорова и омега-квадрат // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1985. Т.51. № 1. С. 60-62.
15. Орлов А.И. Наукометрия и управление научной деятельностью // Управление большими системами / Сборник трудов. Специальный выпуск 44. Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / [под ред. Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева]. М.: ИПУ РАН, 2013. – С.538 – 568.
16. Орлов А. И., Пугач О. В. Подходы к общей теории риска // Управление большими системами. Выпуск 40. М.: ИПУ РАН, 2012. С.49-82.
17. Орлов А.И., Орлова Л.А. Современные подходы к управлению инновациями и инвестициями // Экономика XXI века. 2002. № 12. С. 3 – 26.
18. Орлов А.И., Гуськова Е.А. Информационные системы управления предприятием в решении задач контроллинга // Контроллинг. 2003. № 1(5). С. 52-59.
19. Орлов А.И., Луценко Е.В. Системная нечеткая интервальная математика. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2014. – 600 с.
20. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Перспективные математические и инструментальные методы контроллинга. Под научной ред. проф.С.Г.Фалько. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2015. – 600 с.
21. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Организационно-экономическое, математическое и программное обеспечение контроллинга, инноваций и менеджмента: монография / под общ. ред. С. Г. Фалько. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 600 с.
22. Лойко В. И., Луценко Е. В., Орлов А. И. Современные подходы в наукометрии: монография / Под науч. ред. проф. С. Г. Фалько. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – 532 с.

References

1. Kolmogorov A.N. Osnovnye ponjatija teorii verojatnostej. 2-e izd. — M.: Nauka, 1974. — 120 s.
2. Verojatnost' i matematicheskaja statistika: Jenciklopedija / Gl. red. Ju.V. Prohorov. — M.: Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija, 1999. — 911 s.
3. Orlov A.I. O srednih velichinah // Upravlenie bol'shimi sistemami. Vypusk 46. M.: IPU RAN, 2013. S.88-117.
4. Orlov A.I. Srednie velichiny i zakony bol'shix chisel v prostranstvah proizvol'noj prirody // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2013. № 89. S. 175-200.
5. Orlov A.I. Prikladnaja statistika. - M.: Jekzamen, 2006. - 671 s.
6. Gnedenko B.V. Kurs teorii verojatnostej. - M.: Nauka, 1969. - 400 s.
7. Orlov A.I. Ustojchivost' v social'no-jekonomicheskix modeljah. - M.: Nauka, 1979. - 296 s.
8. Orlov A.I. Asimptoticheskoe povedenie statistik integral'nogo tipa // Doklady AN SSSR. - 1974. - T.219. - №4. - S.808-811.
9. Arkin V.I., Evstigneev I.V. Verojatnostnye modeli upravlenija i jekonomicheskij dinamiki. - M.: Nauka, 1979. 176 s.
10. Orlov A.I. Asimptotika reshenij jekstremal'nyh statisticheskix zadach // Analiz nechislovyh dannyh v sistemnyh issledovanijah / Sbornik trudov VNII sistemnyh issledovanij. - 1982. - Vyp.10. - S. 4-12.
11. Kelli Dzh.L. Obshhaja topologija. - M.: Nauka 1968. - 384 s.
12. Orlov A.I. Statistika ob'ektov nechislovoj prirody // Teorija verojatnostej i ee primenenija. 1980. T.XXV. № 3. S.655-656.
13. Orlov A.I. Novaja paradigma prikladnoj statistiki // Zavodskaja laboratorija. Diagnostika materialov. 2012. №1, chast' I. Tom 78. S. 87-93.
14. Orlov A.I. Rasprostranennaja oshibka pri ispol'zovanii kriteriev Kolmogorova i omega-kvadrat // Zavodskaja laboratorija. Diagnostika materialov. 1985. T.51. № 1. S. 60-62.
15. Orlov A.I. Naukometrija i upravlenie nauchnoj dejatel'nost'ju // Upravlenie bol'shimi sistemami / Sbornik trudov. Special'nyj vypusk 44. Naukometrija i jekspertiza v upravlenii nauk / [pod red. D.A. Novikova, A.I. Orlova, P.Ju. Chebotareva]. M.: IPU RAN, 2013. — S.538 – 568.
16. Orlov A. I., Pugach O. V. Podhody k obshhej teorii riska // Upravlenie bol'shimi sistemami. Vypusk 40. M.: IPU RAN, 2012. S.49-82.
17. Orlov A.I., Orlova L.A. Sovremennye podhody k upravleniju innovacijami i investicijami // Jekonomika XXI veka. 2002. № 12. S. 3 – 26.
18. Orlov A.I., Gus'kova E.A. Informacionnye sistemy upravlenija predprijatijem v reshenii zadach kontrollinga // Kontrolling. 2003. № 1(5). S. 52-59.
19. Orlov A.I., Lucenko E.V. Sistemnaja nechetkaja interval'naja matematika. Monografija (nauchnoe izdanie). – Krasnodar, KubGAU. 2014. – 600 s.
20. Orlov A.I., Lucenko E.V., Lojko V.I. Perspektivnye matematicheskie i instrumental'nye metody kontrollinga. Pod nauchnoj red. prof.S.G.Fal'ko. Monografija (nauchnoe izdanie). – Krasnodar, KubGAU. 2015. – 600 s.
21. Orlov A.I., Lucenko E.V., Lojko V.I. Organizacionno-jekonomicheskoe, matematicheskoe i programmnoe obespechenie kontrollinga, innovacij i menedzhmenta: monografija / pod obshh. red. S. G. Fal'ko. – Krasnodar : KubGAU, 2016. – 600 s.
22. Lojko V. I., Lucenko E. V., Orlov A. I. Sovremennye podhody v naukometrii: monografija / Pod nauch. red. prof. S. G. Fal'ko. – Krasnodar: KubGAU, 2017. – 532 s.